



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosova

Qeveria –Vlada-Government

Ministria e Shëndetësisë-Ministarstvo Zdravstva-Ministry of Health

LISTA E PYETJEVE

për përgatitjen e testit kualifikues për
konkursin e specializimeve

**MINISTRIA E SHËNDETËSISË
MARS, 2011**

BQESP në bashkëpunim me Komitetet specialistike dhe Katedrat e Fakultetit të Mjekësisë ka përpiluar listën e pyetjeve për përgatitjen e testit kualifikues për konkursin e specializimeve.

Kjo listë është përgatitur për të ju lehtësuar kandidatëve procesin e përgatitjes për testimin kualifikues.

Testi do të përmbajë përafërsisht 90% të pyetjeve nga kjo listë.

N.r.	Pyetjet për Mjekësi të Përgjithshme
1	Cila është forma më e dëshirueshme e dhurimit të gjakut
2	Cila është mosha prej të ciles personat e shendoshe mund të dhurojnë gjak
3	Para dhënies së gjakut të plotë është e obligueshme që të dhuruesit e gjakut përveç ekzaminimit fizikal dhe anamnezës të bëhen edhe këto analiza
4	Zbulimi i grupeve të gjakut është bërë duke shfrytëzuar reaksionin antigjen-antitrop, i cili është manifestuar me
5	Në cilat prej sistemeve në vijim të grupeve të gjakut duhet të ekzistojë pajtueshmëria e plotë në mes dhënësit dhe marrësit për tu realizuar transfuzioni i gjakut
6	Forma tipike e sëmundjes hemolitike të të posalindurit (eritroblastozë fetale) është pasojë e papajtueshmërisë në mes gjakut të nënës dhe gjakut të frytit për shkak të antigjeneve të ndryshme të sistemit
7	Cili prej këtyre shkenctarëve i ka zbuluar tri grupet e para të gjakut (A, B dhe O) të sistemit ABO
8	Determinanta antigjenike specifike e sistemit ABO të grupeve të gjakut gjendet në
9	Si substancë prekursorë për formimin e izoaglutinogjeneve të sistemit ABO shfrytëzohet
10	Antitropat e sistemit Rh sipas mënyrës së formimit të tyre bëjnë pjesë në grupin e antitropave
11	Struktura e imunoglobulinave M (IgM) përbëhet nga
12	Cila prej këtyre substancave antikoagulante përdoret për konzervimin e gjakut
13	Albumina është produkt i plazmës që aplikohet te pacientët që kanë çrregullime në
14	Me fjalën citaferezë kuptohet
15	Plazmafereza terapeutike nënkupton
16	Me testin e Coombs-it indirekt bëhet
17	Te pacientët anemik, por që vuajnë nga insuficienca e zemrës preferohet dhënia e
18	Cila prej këtyre komponenteve plazmatike është më efikase në trajtimin e hemofilisë A
19	Për pengimin e transmetimit të shkaktarëve të sëmundjeve infektive që barten me gjak dhe produkte të gjakut është e obligueshme të bëhet testimi i gjakut në praninë e
20	Në komplikimet posttransfuzive jo imune dhe jo infektive bëjnë pjesë

21	Testi i antiglobulinës direkte (Coombs) direkt tregon për
22	Eritrocitet e koncentruara nga një dozë e gjakut pritet ta rrisin hematokritin (Hct) për
23	Tretja fiziologjike (izotonike) është solucion i NaCl në përqëndrim
24	Koha e protrombinës (PT) flet për aktivitetin e faktorëve të kompleksit të protrombinës ku bëjnë pjesë
25	Dhuruesi i gjakut HBsAg pozitiv përjashtohet si dhurues i gjakut
26	Eritrocitet
27	Koha e zgjatur e gjakderdhjes sipas Duke tregon për
28	Gjaku i konzervuar në CPD-A mund të përdoret brenda afatit
29	Cilat prej këtyre imunoglobulinave e kalojnë barrierën placentare
30	Antitruapat
31	Cila nga proteinat e poshtëshënuara ka rolin transportues
32	Cilat komponime proteinike të poshtëshënuara nuk sintetizohen në mëlqi
33	Në sa izoenzime ndahet enzima LDH (laktat-dehidrogjenaza)
34	Kontrolla e brendshme e kualitetit të punës në laborator bëhet
35	Cili nga anjonet e poshtëshënuara është bartës i përcaktimit të osmolalitetit jashtëqelizor
36	Acidi urik është produkti përfundimtar i katabolizmit të
37	Kripërat biliare janë komponime polare që fitohen nga
38	Si veprojnë në aktivitetin enzimatik, inhibitorët jo konkurues
39	Hemoglobinuria paraqitet te
40	Në fazën akute të sëmundjes rriten proteinat e fazës akute dhe në elferogram paraqitet i rritur fraksioni i
41	Cilat enzima rriten te distrofia muskulare
42	Mikromolekula e cila e ulë aktivitetin e enzimit duke u lidhur në një vend tjetër jashtë qendrës aktive është
43	Cili nga komponimet e poshtëshënuara përdoret për të përcaktuar fibrinogjenin
44	Të gjitha përgjigjet për katabolitet e hemit janë të sakta përveç njëres
45	Lipoliza e shtaur te sëmundja e diabetit shkakton në organizëm
46	Përqëndrim të lartë të kuj përbën LDL-kolesteroli
47	Cila komponentë jo proteinike është pjesë aktive e një enzimi
48	Cila përgjigje është e saktë për mioglobinën
49	Me metodën e elektroforezës proteinet klasifikohen në
50	Cila përgjigje është e saktë për inhibitorët kompetitiv
51	Enzima e cila ka aktivitet katalitik maksimal në PH=2 është
52	Cila izoenzimë e enzimit CK (kreatin kinaza) ka rëndësi në diagnostikimin e infarktut akut të miokardit
53	Në cilën rrugë metabolike fitohen drejtë-përdrejtë molekulat e ATP-së
54	Cili është roli më i rëndësishëm klinik i përcaktimit të uresë
55	Cila proteinë e poshtëshënuar nuk rritet në fazën akute të sëmundjes
56	Cila përgjigje e poshtëshënuar është e saktë për enzimat

57	Ureaza është enzim që katalizon urenë dhe bënë pjesë në enzimën me veprim specifik
58	Çka paraqet Km në kinetikën e reaksioneve enzimatike sipas Michaelis-Mentenit
59	NH ₃ i krijuar në muskuj gjatë katabolizmit të komponimeve azotike transportohet me gjak në mëlqi përmes
60	Cili nga frakcionet e lipoproteineve ka përqindje më të lartë të kolesterolit
61	Kur u zbuluan rrezet X
62	Çka ishte me profesion autori i rrezeve X
63	Kur u bë fotografia e parë
64	Çka ishte me kombësi Wilhelmi
65	Çfarë materie ishte baza e filmave të parë në ditët e para pas zbulimit të rrezeve X
66	Prej cilit material përgatiten sot filmat e Rentgenit
67	Deri në vitin 1930 aparatet radiologjike kanë punuar me tension
68	Çfarë formati kishte filmi i zakonshëm
69	Në cilin vit u dha ideja për të fotografuar të gjithë dhëmbët në një film në stomatologji
70	Çfarë formati kishte filmi për të fotografuar të gjithë dhëmbët në një film
71	Prej cilave materie kimike përbëhet fotoemulzioni
72	Sa shtresa fotoemulzioni është filmi standard
73	Si bëhet përpunimi i filmit
74	Prej cilit material përbëhet gypi i Rentgenit
75	Në brendi të gypit të rentgenit gjendet
76	Prej cilit material janë të ndërtuara anoda dhe katoda në gypin e Rentgenit
77	Që të mund të fitohen elektronet e liria temperatura në gyp duhet të jetë
78	Për të fituar rreze X kualitative sa duhet të jetë temperatura në gyp në momentin e fitimit të tyre
79	Ku përfitohen rrezet X
80	Sa duhet të jetë pika e shkrirjes së elementeve që gjenden në gypin e Rentgenit
81	Si quhen elektronet e liria në katodë
82	Sa volt duhet të jenë të lidhura në spirale që të vjen deri të ngrohja e mjaftueshme e saj
83	Rrezet gama dallojnë nga rrezet X sepse
84	Rrezatimi beta nënkupton emetimin e
85	Doza e lejuar e rrezatimit për njerëzit të cilët në mënyrë profesionale merren me rrezatim sillet
86	Ndryshimet sekondare në kocka (metastazat) në fazën e tyre fillestare diagnostikohen përmes
87	Për diagnostikën imazherike radionuklide ekskluzivisht përdoren
88	Për qëllime terapeutike në terapinë radionuklide metabolike përdoren radionuklidet që emetojnë rrezet
89	Depërtueshmëria e rrezeve alfa në ajër sillet

90	Njësi matëse për matjen e dozës ekuivalente është
91	Ndaj rrezatimit radioaktiv janë më të rezistueshme
92	Organet me ndieshmërinë më të madhe ndaj rrezatimit jonizues janë
93	Scintigrafia dinamike e veshkave indikohet për përcaktimin e
94	Scintigrafia dinamike e veshkave punohet përmes aplikimit intravenoz të teknecium radioaktiv të markuar me
95	Për përcaktimin e osteomielitit akut në kocka fillimisht kërkohet
96	Metastazat në kocka për dallim nga tumoret primare në kocka në scintigrafi prezantohen si shumë të shprehura vetëm në
97	Metoda më e dobishme imazherike për përcaktimin e perfuzionit të miokardit është
98	Për përcaktimin apo eliminimin e adenomës toksike të gjëndrës tiroide aplikohet
99	Karakteristikat scintigrafike të embolive të mushkërive janë
100	Ventrikulografia radionuklide në praktikën klinike shërben për
101	Te defekti interventrikular me kahje majtas-djathtas, në scintigrafi do të kemi
102	Indikacion për scintigrafinë e gjëndrës paratiroide është hiperparatiroidizmi primar i cili karakterizohet me
103	Karcinoma medullare e gjëndrës tiroide zhvillohet nga qelizat
104	Tumor marker specifik i kancerit të gjirit është markeri
105	Tumor marker specifik i kancerit të prostatës është markeri
106	Scintigrafia e gjëndrës tiroide punohet me aplikimin per os të
107	Hemangioma në mëlqi, në scintigrafinë e mëlqisë me TcSn-colloid, prezantohet si vatër e
108	Sasia e makrogrimeve që aplikohen për scintigrafinë e mushkërive nuk guxon të kalon
109	Neuronin e parë të rrugës optike e përbëjnë
110	Punktet e lotit (punctae lacrimalis) të cilat janë të zhytura në liqenin e lotit
111	Avullimin e shpejtë të lotëve e pengon sekrecioni i gjëndrave të
112	Kornea është
113	Procesin e akomodimit e mundësojnë
114	Muskulin obliquus superior e inervon
115	Fijet zonulare (zonulat e Zinn-it) janë zgjatime nga
116	Sipërfaqet kryesore refraktuese të syrit janë
117	Shkopijt-qel.neuroepiteliale janë të aftësuar për
118	Protanopia është
119	Te ablacioni i retinës
120	Sindromi Horner-it karakterizohet me
121	Testi pozitiv me edrophonium chloride e vërteton diagnozën te
122	Paraliza e nervit abducens shkakton
123	Bebëza e zgjeruar te pacienti me lëndim të kokës dhe turbullim të vetëdijes është tregues për kompresion në nervin
124	Lezioni i hijazmës optike
125	Pseudopapilloedema e papillës së n.optik haset te

126	Edema dhe prominenca e papillës së n.optik me vizus të ruajtur haset te
127	Retinopatia diabetike joproliferative karakterizohet me këto ndryshime në retinë
128	Gjakderdhjet në retinë në shtresën e fijeve nervore (stratum filorum) paraqiten në formë të
129	Cotton-wool eksudatet në retinë janë mikroinfarktët në shtresën e
130	Synchisis scintillans janë ndryshime që paraqiten si pasojë e ndryshimeve degjenerative në
131	Ndryshimet e kryqëzimit arterio-venoz janë më domethënëse për hipertensionin
132	Neuroretinopatia hipertensive ndodh kur në enë të gjakut shfaqet edhe
133	Lid-lag fenomeni ndodh kur kapaku i sipërm
134	Te iridocikliti, precipitatet dhjamore në endotel të kornesë flasin për etiologji të
135	Ngushtimi koncentrik i fushës së të pamurit - pamja tubare është karakteristike për
136	Metamorfopsia është gjendja kur objektet shihen të
137	Vezullima dhe shëndritja janë simptome prodormale karakteristike për
138	Cili nga infeksionet është më fatal për frytin nëse kalon në trimestrin e parë të shtatzanisë
139	Shkaktari më i shpeshtë i temperaturës post-partale të hershme është
140	Te cila gjakderdhje rrezikohet fryti më së tepërmi
141	Cilat janë simptomet të rupturës kërcnuese të mitrës
142	Cikli menstrual normalisht zgjatë
143	Gjakderdhja menstruale normalisht zgjatë
144	Polymenorrhoea është dukuria e lajmërimit të gjakderdhjes menstruale te
145	Lindje e parakohshme nënkupton lindjen para moshës gestative
146	Lindje normale quajmë ndërprerjen e shtatzanisë prej
147	Cili është komplikimi më i shpeshtë që lidhet me prerjen cezariene
148	Periudha e lehonisë zgjatë
149	Vezorja prodhon këto hormone
150	Përgjegjës për pëlçitjen e qelizës vezë (ovulacion) është hormoni
151	Implantimi i qelizës vezë të fekunduar bëhet në stadin e
152	Trajtimi i endometrioze bëhet me
153	Diagnoza e karcinomës së endometriumit më së shpeshti vëhet me
154	Cila nga këto struktura nuk është pjesë e adneksëve
155	Cilat janë situatat më të shpeshta urgjente gjinekologjike në fëmijëri dhe pubertet
156	Shkaktari i vërtetë i karcinomës së qafës së mitrës është
157	Në menopauzë rritet niveli i njerit prej këtyre hormoneve
158	Incidenca më e lartë e implantimit te gravidanca ektopike është
159	Niveli i Beta-HCG te gravidanca ektopike krahasuar me gravidancën normale është
160	Cili është shkaku më i shpeshtë i pëlçitjes së cipave amnionale të parakohshme
161	Cila nga këto çrregullime shoqërohet me morbiditetin dhe mortalitetin më të

	Iartë neonatal
162	Sipas rekomandimeve Pap-testi duhet të mirret
163	Mjetet kontraceptive hormonale veprojnë në nivel të
164	Aplikimi i spirales bëhet
165	Kontracepcioni emergjent përdoret brenda
166	Te sëmundja trofoblastike rritet në sasi të madhe
167	Tretmani adekuat te molla hydatiforme është
168	Refleksi i kapjes me shputa zhduket pas
169	Omfalocela është malformim i rëndë i murit abdominal përmes të cilit defekt prolabojnë
170	Si i posalindur pas terminit llogaritet fryti që lind pas
171	Sëmundja e membranave hialine është pasojë e mungesës së
172	Sëmundja e membranave hialine paraqitet në mes të javëve të gjestacionit
173	Rrugët e dhënies së surfaktantit te sëmundja e membranave hialine është
174	Sindromi Wilson Mikity është pasojë e
175	Apnea e të posalindurit paraqet
176	Likuori është hemoragjik përpos tek artefakti (lëndimi gjatë P.L.) te gjakderdhja
177	Lëndimet e nervus frenikusit që për pasojë kanë paralizën e diafragmës më të shpeshta janë në anën e
178	Sëmundja hemoragjike e të posalindurit është pasojë e aktivitetit të zvogluar të faktorëve të koagulimit
179	Hiperbilirubinemia fiziologjike është pasojë e rritjes në 72 orët e para të
180	Ikteri (zverdhja) te i posalinduri paraqitet nëse koncentrimi i bilirubinës arrin vlerat prej
181	Te hiperbilirubinemia lactative në qumshtin e nënës janë gjetur të rritura
182	Sasia e ndërrimit të gjakut tek Rh-incompatibilia duhet të jetë
183	Hipoglikemia te i posalinduri me kohë është nëse niveli i glikozës në gjak është
184	Të posalindurit e nënës me diabet në lindje janë
185	Forma më e rëndë e infeksionit me stafilokok të lëkurës është
186	Sepsa e hershme neonatale paraqitet prej
187	Parametër i mirë i infeksionit intrauterin dhe postnatal të posalindurit është rritja e vlerave të
188	Tek sepsa neonatale dominon
189	Citomegalovirusi si shkaktar i infeskioneve intrauterine i takon grupit të
190	Trajtimi i tetanusit neonator bëhet me
191	Enterocoliti necrotizues klinikisht manifestohet në mes ditëve
192	Të posalindurit me Enterocolit nekrotizues duhet ushqyer
193	Prematuri e dyfishon peshën e vet të lindjes me
194	I posalinduri me kohë e dyfishon peshën e tij të lindjes me
195	Sipas peshës trupore në lindje, në inkubator (izoletë) vendosen fëmijët me peshë më të vogël se
196	Ushqimi parenteral permanent i prematurit nënkupton ushqimin e dhënë

	parenteral (i.v.)
197	Koordinimi i refleksit të thithjes, gëlltitjes dhe frymëmarrjes zhvillohet në mes të javëve të gjestacionit
198	Deficiti i lëngjeve në mililitra për kilogram të masës trupore tek dehisrimi i rëndë është
199	Tri shenjat kryesore të tetanisë manifeste janë
200	Tek Kwashiorkori ekziston deficiti i
201	Terapia standarde e zgjedhjes së parë për shërimin e anginës streptokoksike është
202	Kompleksi primar tek tuberkuloza primare përbëhet prej
203	Ndryshimet në urinën native tek Pyelonephritis ac. janë
204	tek profilaksa kronike e kontinuar e konvulzioneve febrile përdoret
205	Doza e insulinës me veprim të shpejtë (Insulin kristal) tek ketoacidoza diabetike, në kg të masës trupore është
206	Hemofilia A trashëgohet në mënyrën
207	Forma më e shpeshtë e paralizës cerebrale të fëmijëve është
208	Imunoglobulina kryesore në qumshtin e nënës janë
209	Çfarë është vjellja tek stenosis pylori hypertrophica
210	Vlerat e fosfatazës alkalike tek rachitis janë
211	Intervali i zgjatur P-Q tek febris rheumatica bënë pjesë në grupin e kriteriumeve
212	Terapia standarde e zgjedhjes së parë për shërimin e etes reumatizmale është
213	Tek paraliza e sipërme e pleksus brachialis (Erb-Duschenne) lëndohet
214	Konvulzionet febrile janë si pasojë e
215	Pas 10 ditësh pas konvulzioneve febrile tipike EEG është
216	Profilaksa kronike kontinuele e konvulzioneve febrile me Fenobarbiton bëhet në dozë prej
217	Paralizën cerebrale infantile e karakterizon
218	Anemia Diamond-Blackfan është
219	Në grupin e anemisë mikrocitare bënë pjesë njera prej këtyre formave të anemive
220	Si dozë terapeutike e anemisë sideropenike përdoren kripërat e fero-sulfatit në dozë prej
221	Profilaksa e anemisë sideropenike bëhet me dozë të preparatit të Fe prej
222	Hemofilia B është si pasojë e mungesës së
223	Purpura anafilaktoide Henoch-Schonlein paraqet
224	Tahipnea është
225	Dispnea te fëmijët karakterizohet si
226	Metoda më e mirë e diagnostikimit të epilepsisë është
227	Mungesa e plotë e aurikulës quhet
228	Te pezmatimet e veshit të brendshëm, membrana timpanale është
229	Othematoma e aurikulës shkakton
230	Çka e dallon paralizën qendrore të nervit facial nga ajo periferike

231	Prezenca e gjakut në veshin e mesëm quhet
232	Çfarë është diagnoza për fëmijën tre-vjecar, të pavëmendshëm që fle me gojë hapur, gërhitës
233	Tympanoplastika nënkupton
234	Çka është paracenteza
235	Riniti idiopatik-vazomotor është
236	Cellulitis orbitae është komplikim
237	Çfarë nuk është shenjë karakteristike e rinitit alergjik te fëmijët
238	Esenca e kirurgjisë funksionale endoscopike të sinusëve (FESS) është
239	Diagnostikimi më i saktë i frakturave të kockave nazale bëhet me
240	Sinuset të cilët drenohen në meatus nasi medius janë
241	Simptomat karakteristike te devijacioni i hundës janë
242	Abscessus peritonsillaris manifestohet me
243	Me tonzillektomi nënkuptohet
244	Inflamacionet e gjëndrave pshtymore quhen
245	Trupat e aspiruar në traktin respirator nxirren me
246	Me testin Rinee vlerësohen
247	Ndihma e parë te lëndimet e hapura të laringut
248	Mbetja e kafshatës së madhe në lumenin e laringut shkakton
249	Sipas TNM klasifikimit të Ca.Laringeale, N paraqet
250	Trajtimi i tuberkulozit të laringut bëhet me
251	Trakeotomia bëhet në
252	Komocioni i laringut mund të përfundon letalisht për shkak të
253	Laringomikroskopia shërben për
254	Papilloma te të rriturit ka mundësi alterimi malinj
255	Mikroorganizmat të cilët për zhvillim kërkojnë sasi të vogël të oksigjenit të lirë quhen
256	Receptorët për kimiotaktizëm dhe fototaktizëm ndodhen në
257	Toksina me natyrë proteinike e prodhuar nga mikroorganizmi dhe i ekskretuar në ambientin përreth është
258	Aminoglikozidet veprojnë duke
259	Ethe, temperaturë, apati, dhembje muskujsh dhe shenja tjera të përgjithshme të infeksionit rezultojnë si rezultat i veprimit të
260	Cili mikroorganizëm predominon si shkaktar i kariesit
261	Prania e kolinës është unike dhe luan rol më të rëndësishëm rregullator në hidrolizën e murit qelizor (autolizës). Kjo lidhet me
262	Të gjitha konstatimet e mëposhtme i përgjigjen M-proteines së grupit A të Streptokokut përveq
263	Ureaplazmat i takojnë klasës së baktereve të quajtura
264	Qelizat që konsiderohen qeliza bazë për imunitetin e lindur lidhen me
265	Streptococcus Grupi B streptococci (Streptococcus agalactiae) ka vetitë e poshtë shënuara përveq

266	Leukocidina dhe toksina dermonekrotike njihet si faktorë të patogjenitetit
267	Cila nga sëmundjet e shënuara nuk bartet me rriqëra (këpusha)
268	Pas tri ditë të lindjes i posalinduri tregon shenja të letargjisë, temperaturës së lartë dhe vjelljes, punkcioni lumbal praninë e bacileve të shkurtra gram pozitive që flasin për meningjit bakterial. Cekni bakteren që fajësohet
269	Pas kalimit të tifos abdominale (s typhi), një numër ngelin si bacil bartës. Në cilën mostër mund të verifikohet bacil bartësia
270	Të gjitha enterobakteret kanë karakteristikat e poshtëshënuara me përjashtim
271	Rikecije janë bakteret që
272	Cilët nga mikroorganizmat e poshtëshënuar konsiderohen strict anaerob
273	Cili nga viruset e poshtëshënuar nuk barten me rrugë fekalo-orale
274	Ethet e maleve Kiasanur, ethet e verdha dhe ethet dengue shkaktohen nga
275	Proteina C, glycoprotein E1 e mbështjellësit, glycoprotein E2 e mbështjellësit dhe ai E3 janë bartës të replikimit të alfavirusëve që zhvillohet në
276	Një mashkull dy muaj pas transplantimit të veshkës ka temperaturë, ethe dhe pneumoni intersticiale bilaterale. Cili prej agentëve mund të jetë shkaktar i kësaj gjendje
277	Cilët nga viruset e poshtëshënuar nuk kanë mbështjellës të jashtëm lipidik
278	Bartja interhumane (prej njeriut në njeri) vlenë për cilin virus
279	Te fëmija 9 vjeçar konstatohet panencefaliti sklerotizues subakut. Në analiza të bëra konstatohet
280	Trypanosoma në lëngun truno shpinor i gjejmë si
281	Infeksioni i njeriut me Trichinela spiralis shkaktohet duke konsumuar mishin e derrit. Pas infeksionit dhe encistimit në musnkuj vjen gjer ke
282	Abscesi në mukozën e zorrës së trashë shkakton
283	Sëmundja e malaries varësisht nga shkaktori mund të zgjasë 18 muaj deri në 20 vite. Cili nga llojet e plazmodieve shkakton formën që zgjatë deri në 5 vite
284	I hollë sikur fije peni, mashkulli 30-40 mm, me fund të lakuar, jeton në regjionin ileocekal, i mbuluar me mukus, femra 35-50 mm me përfundim të trashur, lëshon vezët që embrionohen në ambientin e jashtëm, njeriu infektohet me vezë. Fjala është për
285	Ushqimi për organizmin e njeriut ka rol
286	Aminoacidet esenciale i hasim në artikujt me origjinë
287	Stomatiti angular është pasojë e mungesës së vitaminës
288	Struktura hidrogeologjike ndikon në cilësinë e ujit
289	Nevojat për ujin e pijshëm varen nga
290	Prania e ozonit në zonën joindustriale është indikator i
291	Nevojat fiziologjike ditore për ujë janë
292	Inspektimi lokal i objektit të ujësjellësit na jep të dhëna për
293	Vitamina D ndikon në
294	Shërimi i urisë bëhet
295	Ngrohja globale e atmosferës është pasojë e ndotjes

296	Për shëndetin e njeriut më të rrezikshme janë
297	Prania e klorit residual është indikator
298	Klori në ujë ka efekt
299	Faminoza është
300	Emisioni nënkupton
301	Masat mbrojtëse të aerondotjes janë
302	Klorizimi i ujit është metodë
303	Numri më i besueshëm i bakterieve koliforme në ujin e ujës-jellësit duhet të jetë
304	Njollat e Biotit lajmërohen të mungesa e vitaminës
305	Vitamina K merr pjesë në
306	Arsyet e përpunimit të ujit janë
307	Uji nga shtresa e parë nëntoksore lejohet për pije nëse
308	Stresi rritë nevojat për vitaminën C
309	Plumbi e kalon barrierën placentare
310	Kauzaliteti multip i sëmundjeve nënkupton
311	Burimet e ndotjes së atmosferës janë
312	Efektet e ndotjes së atmosferës në shëndet mund të manifestohen
313	Vetëpastrimi i tokës realizohet përmes
314	Nevojat energjike ditore të njeriut varen nga
315	Sëmundje ngjitëse të traktit të frymëmarrjes janë
316	Për Ethen Hemorragjike Krime Kongo, rrugë e përhapjes së infeksionit është
317	Rrugë e përhapjes së infeksionit për tifon abdominale është
318	Cilët persona konsiderohen mikrobartës kronik-hedhin mikroorganizma
319	Tërbimi përhapet nga njeriu në njeri
320	Portë hyrëse e shkaktarit të sëmundjes së kollës së bardhë është
321	Cili nga opsionet për tulareminë është i saktë
322	Vaksina orale e polios
323	Cilat vakcina japin imunitet më të qëndrueshëm pasvaksinal
324	Keni vaksinën e vdekur dhe të gjallë kundër tifos abdominale. Cilën do ta aplikoni
325	Vaksinat me përbërje anatoksike
326	Vaksina kundër hepatitit B
327	Për shkak të karakteristikave të virusit, hepatiti B është sëmundje më e lehtë se infeksioni HIV/AIDS
328	Imuniteti i fituar natyral pasiv vjen si rezultat
329	Sipas kalendarit të rregullt të vaksinimit, vakcina DPT u jepet fëmijëve deri në cilën moshë
330	Plani i imunizimit (vaksinimit) nuk bënë pjesë në fazën e zbatimit të vaksinimit
331	Vaksina kundër tërbimit
332	Burim i infeksionit të lepra është
333	Sezona më e shpeshtë e paraqitjes së kollës së bardhë është
334	Portë hyrëse e shkaktarit të sëmundjes së difterisë është
335	Karantina aplikohet te

336	"Konstitucionin epidemik" e përshkroi
337	Epidemiologjia në Mjekësinë Publike hulumton
338	Inkubacioni te epidemitë alimentare zgjatë
339	Kush i vuri bazat e teorisë hidrike
340	Fumigacioni është metodë për asgjësimin e
341	Me cilën metodë sqarohet procesi epidemik Person vend kohë
342	Se epidemiologjia duhet të jetë: Ep.Klinike-serologjike mendon
343	Klasifikimi i sëmundjes ngjithëse është
344	Mikrobartësit
345	Me cka karakterizohet popullata e vendeve të zhvilluara
346	Në vetëdijësimin e popullatës propaganda ka rëndësi
347	Te popullata progresive, "arbor vitae" ka formën e
348	Cili prej komponenteve e mbanë balansin te "Triasi i Gordon-it"
349	Cilat janë mjetet edukativo shëndetësore
350	Fertiliteti është
351	Kujdesi dytësor dhe tretësor duhet zgjidhur
352	Rrumbullakso fazën e parë në ciklin e planifikimit
353	Me imigrim nënkuptojmë
354	Cka është barnatorja
355	Morbiditeti specifik paraqet
356	Arsimimi shëndetësor është
357	Në masat e diagnostikimit bëjnë pjesë
358	Cili indikator është më i sigurtë për vlerësimin e gjendjes shëndetësore
359	Cila prej masave sociale mjekësore është më kost-efektive
360	"Gjenerator" i sistemit shëndetësor është
361	Cilat janë sfidat e shëndetit publik të lidhura me kulturën dhe edukimin
362	Cilat sëmundje kanë prejardhje nga ushqimi jo dietal, pirja e duhanit, konsumimi i tepërt i alkoolit, aktiviteti i zvogluar fizik, si dhe një numri të faktorëve karakteristik për njerëzit e shteteve të zhvilluara
363	Tregues të kualitetit të veprimtarisë shëndetësore spitalore janë
364	Gjatë vitit 2009 një spital me 200 shtretër ka punuar rregullisht. Sa pritet të jetë kapaciteti spitalor në këtë spital
365	Me rastin e paraqitjes së epidemisë së hepatitit është formuar grupi punues për planifikimin e aktiviteteve të nevojshme për vetëdijësimin e popullatës së atij territori. Për cilin lloj të planifikimit bëhet fjalë
366	Cili grup i femrave quhen femra të moshës fertile
367	Sipas autorit Grin, në metodat e komunikimit hyjnë
368	Faktori që ndikon në intenzitetin e mortalitetit është
369	Në grupin e indikatorëve pozitiv të gjendjes shëndetësore të popullatës numërojmë
370	Klasifikimi i X-të ndërkombëtar i sëmundjeve është shifrim
371	Sistemi shëndetësor është

372	Faktorët biologjik, mjedisor, të sjelljes, organizativ, politik dhe social që kontribuojnë në gjendjen shëndetësore të individit, grupit, dhe komunitetit i quajmë
373	Aftësia e personit të kuptojë dhe respektoj vlerat, qëndrimet dhe besimet, konsiderata e përgjegjja ndaj këtyre diferencave në planifikim, zbatim dhe evaluim të programeve të edukimit shëndetësor quhet
374	Këshillimi është proces gjatë të cilit
375	Cila është karakteristika e deliriumit
376	Pacienti me delirium është
377	Në trajtimin e deliriumit rregull i rëndësishëm në planin e trajtimit është
378	Ndryshimet në të kuptuar nga deliriumi vërehen nga
379	Demenca haset më shpesh te
380	Te demenca kemi
381	Sëmundja Alzheimer është
382	Fillimi i demencës zakonisht është
383	Te demenca momenti kur gjendja duket më serioze për njerëzit që janë afër tyre është kur
384	Nevoja psikike dhe fizike për vazhdim të marrjes së substancës quhet
385	Nevoja për rritje sasiore të substancës së marrë që të arrijë efektin e dëshiruar quhet
386	Delirium tremens haset te
387	Sindroma e Korsakoff është
388	Hapi i parë në trajtimin e tërheqjes nga alkooli është
389	Personi alkoolist më së shpeshti vie në trajtim me
390	Heroina bënë pjesë në grupin e
391	Komplikim serioz i abuzimit me opioide është
392	Metadoni është efektiv në trajtimin e abstinencës nga
393	Amfetamina bënë pjesë në grupin e
394	Te intoksikimi me cilën nga drogat e poshtëshënuara kemi djersitje, ethe, tahikardi, zgjerim të bebëzave, ngritje të TA, mundim, vjellje, tremor, aritmi, konvulzione
395	Terapi efektive në trajtim të vartësisë nga kokaina është
396	Personat që veprojnë me violencë të theksuar dhe impulsivitet kur janë nën ndikimin e substancës kanë përdor
397	Te intoksikimi dhe mbidozimi me benzodiazepine duhet bërë
398	Cili nga vijuesit është kundër efekti i benzodiazepineve nëse përdoren për një kohë të gjatë dhe pa konsultim me mjekun
399	Në psikoterapinë e grupit pacientët
400	Psikoza apo crregullimi psikotik nënkupton
401	Skizofrenia është
402	Te skizofrenia kemi
403	Halucinacionet janë patognomonike për
404	Tipi më i zakonshëm i halucinacioneve në skizofreni janë
405	Cili nga faktorët etiologjik është më i rëndësishmi në paraqitjen e skizofrenisë

406	Në rast të paraqitjes së Sch te njeri nga bineqët monozigot, shansi i paraqitjes së Sch te binaku tjetër është
407	Deluzionet persekutore paraqiten te skizofrenia
408	Crregullimi deluzionale karakterizohet me
409	Crregullimi skizofrenik përpos crregullimit të afektit duhet të ketë
410	Crregullimi psikotik që e ndajnë dy persona në të cilin njëri shtë dominues e tjetri nënshtrues quhet
411	Antipsikotikët përdoren në trajtimin e
412	Antipsikotikët ndryshe quhen edhe
413	Haloperidoli bënë pjesë në grupin e medikamenteve
414	Risperidoni bënë pjesë në grupin e
415	Klozapina si efekt anësor ka
416	Depo neuroleptikët parenteral që përdoren për trajtimin e skizofrenisë janë
417	Sindromi malinje neuroleptike shkaktohet nga
418	Pacienti me simptoma ekstra piramidale jatrogjene duhet të trajtohet
419	Sindromin ekstra piramidal akut e shkakton
420	Crregullimi bipolar paraqet
421	Crregullimi që dikur është quajtur psikoze maniako depresive sot quhet
422	Disponimi manik paraqitet te
423	Cili nga simptomet e poshtëshënuara nuk është simptom i epizodës manike
424	Crregullimi depresiv madhor haset më tepër te
425	Vetëvrasja më tepër paraqitet te
426	Tentim vetëvrasjet janë më të shpeshta te
427	Pacienti suicidal duhet të
428	Tentim suicidi duhet të trajtohet nga
429	Pacienti që është i rrezikshëm për vetveten dhe rethin duhet të
430	Idetë e pavlerës, pashpresës dhe fajësisë hasen te
431	Inhibitorët selektiv të rikapjes së serotoninës përdoren në trajtimin e
432	Në trajtim të depresionit është efektive
433	Inhibitorët selektiv të rikapjes së serotoninës janë
434	Amitriptilina është
435	Fluoxetina është
436	Anoreksia nervosa është
437	Anoreksia nervosa haset më tepër te
438	Te anoreksia nervosa kemi
439	Trajtimi i anoreksisë nervoze përfshin
440	Frekuenca më e lartë e mortalitetit në crregullimet psikiatrike haset te
441	Te bulimia nervoze kemi
442	Konsumimi i menjëhershëm i sasive të mëdha të ushqimit për një periudhë të shkurtër kohore është karakteristikë e
443	Antropofagia është
444	Dispaerunia është
445	Te vaginizmi kemi

446	Vaginizmi
447	Ejakulacioni i parakohshëm është
448	Përdorimi i objektit johuman si metodë e preferuar e arritjes së nxitjes seksuale quhet
449	Pedofilia nënkupton kontaktin seksual
450	Ekzibicionizmi është
451	Shkaktimi i dhimbjes fizike ose psikologjike personit tjetër për të arrit eksitim seksual quhet
452	Nëse përjetimi i dhimbjes fizike ose psikologjike ndihmon për tu arrit eksitimi seksual kemi të bëjmë me
453	Transeksualizmi është
454	Sëmundja neurologjike që shkakton impotencë është
455	Shkaku somatik që mund të shkaktoj impotencë është
456	Frika për të qenë vetëm, friga për tu larguar nga shtëpia apo friga për tu ndodhur në sheshe publike nga të cilat largimi mund të jetë i vështirë quhet
457	Fobia sociale është
458	Te crregullimi i panikut ata që janë
459	Trajtimi i crregullimit të panikut përqendrohet në
460	Crregullimi i ankthit të gjeneralizuar karakterizohet nga
461	trajtimi me medikamente të crregullimi i ankthit të gjeneralizuar përdoret për
462	Cili nga simptomat në vijim reagon pozitivisht në përdorimin e diazepamit tek crregullimi i ankthit të gjeneralizuar
463	Te trajtimi i fobisë specifike dhe sociale terapia më efektive është
464	Mendimet, impulset apo parafytyrimet e qëndrueshme, që edhe për vetë personin janë të pakuptimta dhe që për të neutralizuar ato personi bën disa veprime quhen
465	Veprimet e përsëritura të qëllimshme, të pamenduara që pakësojnë ankthin dhe që kryhen për të neutralizuar një obsesion quhen
466	Te trajtimi me medikamente të crregullimit obsesivo-kompulziv trajtimi më efektiv është trajtimi me
467	Crregullimi i stresit akut paraqitet
468	Në situatë të stresit nuk kemi
469	Stresi ndërmjetësohet përmes
470	Stresi kronik si pasojë mund të ketë
471	Crregullimi i stresit pas traumës paraqitet
472	Frika e pabazuar se personi vuan nga ndonjë sëmundje serioze quhet
473	Cila nga diagnozat psikiatrike në vijim është më e shpeshtë tek pacientët me dhimbje acute
474	Crregullimi konverziv bën pjesë në
475	Dështimi për tu përshtat ndaj normave shoqërore që lidhen me sjelljet e ligjshme që vërehet nga veprimet e përsëritura ekzekutuese e që përbëjnë bazë për arrestim është karakteristikë e
476	Cila nga të poshtëshënuarat nuk është karakteristikë e crregullimit narcistik të personalitetit

477	Crregullimi kufitar i personalitetit bënë pjesë në grupin e crregullimeve të personalitetit të
478	Për të diagnostikuar prapambetjen mendore nevojitet
479	Cilat nga të poshtëshënuarat nuk është karakteristike e prapambetjes së thellë mendore
480	Klozapina si efekt anësor ka
481	Depo neuroleptikët parenteral që përdoren për trajtimin e skizofrenisë janë
482	Efekt anësor antikolinergjik i antipsikotikëve është
483	Akatizia është efekt anësor i medikamenteve
484	Cili nga të poshtëshënuarit nuk është crregullim i gjumit
485	Crregullimi i gjumit haset te
486	Gjatë pjekurimit- maturimit të eritrocitit
487	Eritropoetina krijohet në
488	Mieloblastet janë prekursorë të
489	Mungesa e folateve në organizëm shkakton
490	Trombocitopenia mund të shkak të
491	Niveli i ulur i fosfatazes alkaline në leukocite, haset tek
492	Vitamina B12 absorbohet në
493	Kardiomiopati në përgjithësi ndahen në
494	Fibriloflateri atrial mjekohet me
495	Insuficienca mitrale karakterizohet me
496	Stenoza aortale karakterizohet me
497	Stenoza mitrale karakterizohet me
498	Diagnoza e infarktut akut të miokardit vendoset në bazë të
499	Diabeti mellitus tip 2 paraqitet
500	Ndërlikimet kornike të diabetit tip 2 janë
501	Hipertireoza parësore karakterizohet me
502	Hiperparatireoidizmi karakterizohet me
503	Sëmundja e Adisonit karakterizohet me
504	Sindroma Sheehan karakterizohet me
505	Barrierën antirefluks e përbëjnë
506	Karcinom aproksimale e ezofagut nga aspekti histopatologjik është
507	Në terapinë e formave të rënda të ezofagut, rol kyç kanë
508	Standard të artë për diagnozën e ulçerës gastrike paraqet
509	Në etiologjinë e karcinomës së lukthit rol më i rëndësishëm kanë
510	Dislokacioni atlanto aksial në kuadër të artritis reumatoid shkakton
511	Dobësimi i muskujve proksimal, vlerat e rritura të enzimeve muskulare, ndryshimet elektromiografike, etj., paraqiten në këtë sëmundje
512	Mikroorganizmat gram pozitiv dhe negativ shkaktojnë
513	Artriti tuberkular paraqitet më shpesh në
514	Reaktantët e hershëm inflamator janë
515	Testi Coombs përdoret për përcaktimin e
516	SRS-a është substancë që zërthehet nga

517	Pllakat për mikrotitrim përdoren për
518	Përcaktimi i Rh- faktorit bëhet me metodën
519	Gjatë tipit të parë të hipersenzibilitetit lirohet mediatori
520	Niveli i AMP- ciklike në bazofile me rastin e kontaktit me Ag
521	Limfocitet T rolin mbrojtës të tyre e kryejnë përmes
522	Limfokinet lirohen nga
523	Kalikeina lirohet me reaksionet e tipit
524	Me cilën pjesë të monomerit ngjiten reagentet për alergjeni
525	Testi RIST bënë pjesë në
526	Sa rrugë të aktivizimit të komplementit ekzistojnë
527	Histamina është
528	Qelizat e imunitetit të lindur që kryejnë vrasje jashtëqelizore jospesifike (NK) kanë karakteristikat e
529	Imunodeficiencat ndahen në
530	Sindromi i Down- it përcillet me karakteristikat gjenetike të trisomisë të kromozomi numëror
531	Hipersenzibiliteti i tipit të katërt ndodh nga aktivizimi i
532	Temperatura është simptomë e
533	Në bazë të ndryshimeve brenda ditës temperaturat ndahen në
534	Temperatura kontinuale është kur dallimi i temperaturës brenda ditës është
535	Në bazë të lëvizjes së temperaturës gjatë sëmundjes kemi temperatura
536	Inkubacioni është
537	Cilat janë parimet e diagnostikimit të sëmundjeve ngjitesë
538	Diagnoza e sëmundjeve ngjitesë bëhet në bazë të
539	Diagnoza "ex juvantibus" është kur diagnoza përcaktohet me
540	Te cila nga këto sëmundje paraqitet më shpesh herpes febrilis
541	Në një sëmundje që karakterizohet me temperaturë monofazike paraqitja e temperaturës bifazike do të thotë
542	Nëse sëmundja rikthehet pa përfunduar ende mjekimi nënkupton
543	Skarlatina shkaktohet nga
544	Erizipella
545	Cila nga këto sëmundje është sëmundje ekzantematike
546	Epstein Barr virusi shkakton
547	Shkaktari i poliomielitit bënë pjesë në grupin e viruseve
548	Poliomieliti karakterizohet me
549	Komplikim i vonshëm i fruthit është
550	Encefaliti herpetik trajtohet me
551	Pertusisi ka këto ndryshime
552	Meningoencefaliti tuberkular karakterizohet me
553	Meningjitet seroze trajtohen me
554	Neurobruceloza trajtohet me
555	Virusi herpes simplex 2 atakon më së shpeshti
556	Cila nga këto sëmundje është zoonozë

557	Meningjiti tuberkular karakterizohet me ndryshime biokimike në likuor
558	Hepatiti A përhapet me rrugë
559	Për cilën formë të hepatitit nuk ka vaksinë mbrojtëse
560	AIDS trajtohet me
561	Cilat nga këto sëmundje janë më të shpeshta në Kosovë
562	Proliferimi normal i qelizave bazale është
563	Hipoderma ose nënlëkura është e vendosur në
564	Rritja e flokut realizohet në
565	Llupa është thjerrëz bikonvekse, e cila në largësi të caktuar e zmadhon fushën e të vërejturit deri
566	Fenomeni i Auspity-it ka vlerë diagnostike të
567	Hormoni adrenokortikotrop këshillohet për dermatozat
568	Shkaktar i scabies-it është
569	Femra e pediculosis corporis i vendosë vezët në
570	Pasqyra klinike e ictus insecti është variabile
571	Kerion Celsi është sëmundje e shkaktuar nga dermatofitet
572	Favusi kërkon mjekim
573	Tinea pedis favorizohet nga
574	Candidiasis mund të lokalizohet në
575	Shkaktar i scrophulodermas është ky tip i bacilit
576	Herpes simplex recidivans mjekohet me
577	Shenjat kryesore të herpes zoster janë
578	Për mjekimin lokal të fazës kronike të ekzemës vulgare jepen
579	Te angioedema procesi alergjik zhvillohet
580	Dermatozat profesionale
581	Lupusi diskoid lokalizohet në
582	Efloreshenca karakteristike të pemfigusi vulgar është
583	Pitiriazia e trëndafiltë (pityriasis rosea) është
584	Keloidi është pasojë e
585	Melanoma malinje është trajta më e rrezikshme e karcinomës së lëkurës dhe paraqitet
586	Acne oleinica shkaktohen për shkak të
587	Alopecia areata është
588	Treponema pallidum shkakton
589	Cerviciti gonorroik akut manifestohet me
590	Nëse një lojtar gjatë lojës manifeston dhimbje të forta në ekstremitetin e poshtëm dhe papritmas detyrohet të dalë nga loja, lëndimi më i mundshëm është
591	Lëndimet e unazave të qafës mund të jenë pasojë
592	Gjakderdhja epidurale manifestohet me tri simptome karakteristike
593	Pneumotoraksi spontan primar ndodh
594	Sëmundjet më të shpeshta të gjirit janë
595	Triada klasike- disfagjia, regurgitimi dhe humbja e peshës janë karakteristike e

596	Hernitë diafragmale të l porsalinduri
597	Një 18 vjeçar mashkull, lajmërohet në Qendrën Emergjente me plagë me armë zjarri në krahërorin e majtë në linea axillaris anterior, në hapësirën e shtatë interkostale. Një zë vërsulës (fishkëllues) dëgjohet gjatë inspiriumit. Cili është menagjimi urgjent të ky pacient
598	Një vajze e re 15 vjeçare ka pasur lëndim në retroperitoneumin e djathtë me kontuzion duodenal. Cili është testi i duhur për të përjashtuar rupturën e duodenumit
599	Një mashkull i moshës 40 vjeç goditet nga automjeti dhe lëndohet në pelvik. Cilat shenja përcjellëse janë më shumë indikative (treguese) për lëndimin uretral
600	Shtatëzëne në muajin e tetë, sillet në Qendrën Emergjente. Ajo është goditur nga makina dhe ankon për dhimbje barku. TA i saj është 80/60mmHg, Puls i 120/min, frymemarrja 30/min. Vijat e gjëra intravenoze janë vendosur në vent cubitale në të dy anët. Frekuenca e zemrës së fetusit është 160/min. Cili është hapi i mëtejshëm
601	Iskemia cerebrale fillon nëse shtypja perfuzive e trurit është
602	Lëndimet e rektumit të përcjellura me vdekshmëri të lartë janë
603	Ruptura e uretrës klinisht manifestohet me
604	Lëndimet traumatike të vena cava inferior përcillen me gjendje
605	Ndërlikimi më i rëndë i splenektomisë është
606	Shkalla e dytë e djegies ka këto shenja
607	Ileusin strangulativ e shkaktojnë
608	Duke marrë parasysh lëndimet e qafës cila prej këtyre është e vërtetë
609	Succinylcholine nuk duhet të i jepet një pacienti
610	Aspirimi i trupave të huaj më së shpeshti ndodh në grupmoshat
611	Dislokimet e bërrylit në të shumtën e rasteve shoqërohen me dëmtime të
612	Shoku neurogjen
613	Në rastin e djegieve me rrymë elektrike, me rëndësi vendimtare në shkallën e dëmtimit të indeve është
614	Cili nga këta pacientë ka nevojë për hospitalizim në spitalin për trajtimin e djegieve
615	Përpos vertigos, sëmundja Meniere gjithashtu karakterizohet me
616	Cili nga pohimet që ka të bëjë me miastenia gravis është i saktë
617	Si antidot pralidoxime 2- PAM
618	Doza standarde prej 0.4mg e naloksanit duhet të jetë e mjaftueshme për neutralizimin e efektit të mbidozimit të
619	Kiematogjeneza është periudha zhvillimore prej
620	Malformacioni primar paraqet defektin zhvillimor
621	Disrupcioni është
622	Inverzioni kromozomal është
623	Poloploidia është aberacion kromozomal
624	Sindromi i Klinefelter-it ka kariotipin
625	Sindromi i Turner-it është rezultat i abnormalitetit të
626	Tërësia e materialit trashëgues të një individi quhet

627	Hemofilia B është sëmundje trashëguese që trashëgohet përmes
628	Amniocenteza e hershme aplikohet te shtatëzënat si metodë diagnostike në javën gestative të
629	Si rezultat përfundimtar të mutacioneve kromozomike do të kemi
630	Kur dy alele të ndryshëm shprehen në prani të njëri-tjetrit ata quhen
631	Sindromi I Edwards-it ka kariotipin
632	Progjeneza është periudha zhvillimore
633	Sindromi I Marfanit ka trashëgimi të tipit
634	Kimerat te njeriu munden me qenë
635	Metafaza mejotike parqet
636	Ndihmesa direkte e ultrazërit është
637	Insercioni është
638	Fibroza cistike ka trashëgimi të tipit
639	Sistemi HLA gjendet në kromozomin
640	Metoda e ekzaminimit prenatal me ultrazë është metodë
641	Stenoza hipertrofike e pilorusit ka trashëgimi të tipit
642	Displazioni është
643	Hipoplazioni është anomali
644	Insulina ndikon në metabolizmin e
645	Enzimet Tripsina dhe kimotripsina ndikojnë në
646	Somatostatina
647	Kretenizmi është qrrregullim i cili vjen për arsye të
648	Aldosteroni ndikon në tubulet e veshkeve
649	Endorfinat(Met-enkefalina) si morfin endogjen ka
650	Barnat që e ulin shpejtësinë e zbrazjes së stomakut janë
651	Molariteti i një tretësire tregon:
652	Lotet kanë një vlerë mesatare pH
653	Infuzionet intravenoze janë
654	Pergatesat parenterale janë
655	Ciprofloxacina I takon antibiotikeve të
656	TTS-pergatesat përdoren për shkak të:
657	Në trajtimin e hiperplazionit benign të prostatës përdoret:
658	Gjysemkoha plazmatike e barnave përcakton
659	Cili nga pohimet për absorbimin e barnave është i pasaktë
660	Qka bëjnë induktoret e enzimeve hepatike P450
661	Nitroglicerina konvertohet në monoksid azotit, si radikal i lirë reaktiv e që aktivizohet nga azoti
662	Klirensi renal rritet nëse bari:
663	Cili nga barnat/substancat endogjene veprojnë me hapjen e kanaleve jonike
664	Cili nga barnat nuk inhibon enzimet mikrozomale hepatike:
665	Qka është e pasakte për rrugën intravenoze të dhënjes së barnave
666	Nëse bari jep efekt të njëjtit pa marrë parasysh mënyrën e aplikimit preferohet

667	Perdorimi i dozave te larta te benzilpenicilines si efekt anësor paraqitet
668	Cili diuretik preferohet ne reduktimin e edemave te një e sëmurë 60 vj. me insuficiencë renale
669	Te shoku hipovolemik preferohet dhenja intravenoze :
670	Imipramina perdoret:
671	Cili diuretik perdoret te gjendjet komatoze me edemë cerebrale.
672	Glikozidet e digitalisit ndikojne në
673	Bari i zgjedhjes te aritmit ventrikulare të rënda, si pasoje e toksicitetit të digitalisit është
674	Superinfeksionet me Candida Albicans, mund të jetë si pasojë e përdorimit te zgjatur te :
675	Cili nga barnat përdoret për të trajtuar infeksionet me virusin sincial respirator dhe hepatitin kronik C
676	Sindromi i "Bebes së përhirt" si efekt anësor I kloramfenikolit manifestohet te femijet për shkak të:
677	Fluorokinolonet kunderindukohen te femijet nen moshen 18vj. për shkak se mund te manifestojnë
678	Për shkak te efektit teratogjen gjatë shtatzënsisë duhet të shmanget përdorimi i .
679	Te trajtimi me glukokortikoide si efekt anësor paraqitet:
680	Cili bar shkakton hipoglikemi te të smuret me Diabetes Mellitus tip II. dhe maskon shenjat dhe simptomet e hipoglikemisë:
681	Ne mbidozimin e paracetamolit si antidot perdoret
682	Terapija antituberkulotike shoqerohet me vitaminen:
683	Ergometrina perdoret si
684	Depo pergatesat veprojnë më gjatë sepse
685	Afiniteti i Co ne krahasim me O per hemoglobinen eshte
686	Antidoti tek helmimet me cianide eshte
687	Barnat që veprojnë drejtpërdrejt mbi agjentet shkaktues të nje sëmundje quhen barna
688	Supostet me polietilenglikol, veprimi i tyre në krahasim me tabletat orale është:
689	Molekulat që lidhen më receptoret, por pa shkaktuar ndonjë përgjigje biologjike quhen:
690	Neuroleptiket ndryshe njihen si:
691	Frenuesit e monoaminoksidazës kanë veprim
692	Receptoret benzodiazepinik gjenden krejt ngjitur më receptoret:
693	Flumazenil vepron si
694	Lamotrigina ka veprim
695	Penicilamina perdoret
696	Neostigmina vepron si
697	β -bllokuesit, përmes bllokimit te β -1 receptoreve, frenojne ne menyre konkuruese veprimin:
698	Percakto kohen ideale te heqjes se penjeve pas qepjes se plages ne fytyre

699	Te pacienti me lendim te fresket I cili para dy viteve eshte vaksinuar me vaksine antitetanike si do te veproni
700	Komocioni I trurit eshte
701	Gastroshiza eshte
702	Tiroidea - gjendra mbrojtese anatomikisht perbehet nga
703	Fibroadenoma mammae eshte
704	Hidronefroza eshte
705	Bronkiektazia eshte
706	Varikozitetet jane
707	Vullnus scilopetarium eshte
708	Aborti definohet si perfundim I shtatzanise bazuar ne sa jave te gestacionit
709	Shumica e shtatzanive ektopike ndodhin ne
710	Tumoret me te shpeshta malinje te vagines jane
711	Gjate ciklit menstrual te grate, bakteret me te shpeshta ne vagine jane
712	Infeksionet me te shpeshta te grate me bakteren e Gonorese ndodhin ne
713	Infertiliteti definohet si pamundesi e qiftit per koncepcion ne marredhenie te rregullta seksuale te pambrojtura ne periudhen kohore
714	Cila nga pergjigjet e dhena me poshte eshte shkaktari me I zakonshem I gjakderdhjeve masive nga pjesa e poshtme e traktit GI
715	Dislokimi I artikulacionit qe me se shpeshti shoqerohet me lendim te arteries eshte dislokimi i
716	Shkaku I toksicitetit te helmimet me metanol eshte
717	Endolimfa eshte leng I cili mbush
718	Si quhet prezenca e gjakut ne kavum timpani
719	Imuniteti pasiv artificial fitohet
720	Inkubacioni maksimal te kolera zgjate
721	Sipas fjalorit mjekesor britanik epidemiologjia konsiderohet
722	Pas kalimit te gonorese ngelet imunitet
723	Kimioprofillaksa eshte e obliguar te
724	Monokarenca eshte mungese e
725	Pelagra shkaktohet nga mungesa e
726	Uji si indikator I kualitetit te mjedisit eshte
727	Programet per parandalimin e semundjeve jongjitese
728	Metoda epidemiologjike e hulumtimit shkencor
729	Burimet dhe grumbullimi i te dhënave në epidemiologji
730	Faktorët e riskut te semundjet kronike jongjitese
731	Validiteti i një metode diagnostike në shëndetësinë publike
732	Vlerësimi i gjendjes shëndetësore të popullatës
733	Organigrami gjeneral i një studimi epidemiologjik
734	Klasifikimi I studimeve epidemiologjike
735	Hulumtimi epidemiologjik i semundjeve ngjitese
736	Fshehtesia profesionale
737	Karakteristikat epidemiologjike të semundjeve kronike jongjitese

738	Etika ne hulumtimet klinike
739	Aspektet kualitative të diagnostikimit në nivelin e kolektivitetit
740	Planifikimi shëndetësor dhe plotika shëndetësore
741	Principet e menixhmentit në shërbimin shëndetësor
742	Koncepti i kujdesit shëndetësor parësor
743	Karakteristikat e sistemit shëndetësor dhe organizimi
744	Epidemiologjia klinike
745	Roli i sigurimit social në mbrojtjen shëndetësore
746	Qendrimi etik ndaj pacientit ne kirurgji
747	Diagnostika mjekësore individuale dhe kolektive
748	Multikauzaliteti i sëmundjeve kronike jongjitëse
749	Qendrimi etik ndaj femijes se semure
750	Depistimi i sëmundjeve
751	Qendrimi etik ndaj pacienteve ne gjinekologji-obstetrike
752	Rezonimi kauzal në mjekësi
753	Kriteret në gjykimin e relacionit shkak-pasojë
754	Karakteristikat epidemiologjike të shkaktarit, individit dhe ambientit
755	Etika në shëndetësinë publike
756	Aspekti etik i masave preventive dhe studimet epidemiologjike
757	Komparabiliteti dhe reprezentativiteti i studimeve deskriptive
758	Studimet në klinikë dhe në shëndetin e komunitetit
759	Roli i epidemiologjisë në administrimin dhe planifikimin e shërbimeve dhe programeve shëndetësore
760	Etika dhe eksperimentimi me njerëz
761	Relacioni mjek-pacient
762	Detektimi i parakohshëm i predispozitave gjenetike
763	Aspektet kuantitative të diagnostikimit në nivelin e kolektivitetit
764	Regjistri i kancerit
765	Indikatorët e shëndetit
766	Parimet e kujdesit shëndetësor;
767	Të drejtat dhe detyrimet qytetare
768	Standardet e kujdesit shëndetësor
769	Nivelet e organizimit të kujdesit shëndetësor
770	Kujdesi parësor shëndetësor
771	Kujdesi tretësor shëndetësor
772	Themelimi dhe organizimi i institucioneve shëndetësore
773	Udhëheqja dhe mbikëqyrja e institucioneve shëndetësore
774	Kushtet dhe procedurat për zbatimin e kujdesit shëndetësor
775	Financimi i kujdesit shëndetësor
776	Sigurimi themelor shëndetësor
777	Sigurimi i mjeteve për punë të institucioneve shëndetësore
778	Sistemi informativ shëndetësor

779	Llojet e institucioneve shëndetësore
780	Licencimi i punëtorëve shëndetësorë
781	Kushtet dhe procedurat e licencimit
782	Specializimet, kushtet dhe procedurat e specializimit
783	Edukimi i vazhdueshëm profesional
784	Veprimtaria private shëndetësore
785	Licencimi i veprimtarive private shëndetësore
786	Këshilli i përgjithshëm profesional
787	Mikëqyrja profesionale
788	Sterilizimi artificial
789	Kujdesi shëndetësor gjatë gjendjes së jashtëzakonshme
790	Përgjegjësitë disiplinore të punëtorëve shëndetësorë
791	Kodi etik mjekësor
792	Cilat janë rastet e kundërvajtjeve dhe shkeljeve administrative nga institucionet shëndetësore
793	Rastet e kundërvajtjeve dhe shkeljeve administrative nga punëtorët shëndetësorë
794	Edukimi themelor profesional
795	Provimi i licencës (provimi profesional)
796	Shoku dhe llojet e tij
797	Gjakderdhja
798	Hernitë
799	Koma diabetike
800	Abdomeni akut
801	Ulçera gastroduodenale
802	Frakturat
803	Aborti
804	Toksikozat
805	Glaukoma akute
806	Djegjet
807	Infarkti i miokardit
808	Diabeti
809	Hipertensioni arterial
810	Ciroza e mëlçisë
811	Astma bronkiale
812	Ethet reumatike
813	Anemia pernicioze
814	Cianoza
815	Tuberkulozi
816	Glomerulonefriti
817	Ileusi
818	Kalkuloza e fshikzës së tëmthit
819	Apendiciti

820	Lëndimet e syrit
821	Placenta previa
822	Dezinfektimi
823	Sterilizimi
824	Hemorragjitë gastrointestinale
825	Bronkiti akut
826	Sëmundja e Kesonit
827	Hemotoraksi
828	Helmimi me CO
829	Migrena
830	Pankreatiti akut
831	Epistaksis
832	Shtatzënia
833	Hemorroidet
834	Artriti reumatoid
835	Edema pulmonare
836	Sipas autorit Grin, në strategjite e aftesimit hyjnë
837	Cili nga kushtet e poshtëshënuara duhet të plotësohet në mënyrë që Mjekësia Familjare të jetë efektive
838	Faktorët e poshtëshënuar kanë ndikim në shkallën e përshkrimit të udhëzimeve për vizitë tek specialisti nga ana e mjekëve familjarë
839	Në mjekësinë familjare, mjeku mirret
840	Mjeku familjar zakonisht
841	Raporti i mirë ndërmjet mjekut dhe pacientit, ndihmon
842	Modeli i Stott-it dhe Davis-it ka të bëjë me
843	Në konsultime, komunikimi jo-verbal nënkupton
844	Regjistri moshë-gjini përdoret për
845	Vlerësimi mjekësor (vetëvlerësimi)
846	Rivalidimi
847	Në marrjen e vendimeve etike
848	Në marrjen e vendimeve etike, principet kryesore janë
849	Cilat nga grupet e poshtëshënuara konsiderohen të rrezikshme për përshkrim të barnave
850	Tek cilat barna të poshtëshënuara, doza duhet rritur ngadalë
851	Cilat nga metodat e poshtëshënuara do të përmirësojnë përmbajtjen e pacientit ndaj regjimit të barnave
852	Tek cilat barna të poshtëshënuara, doza duhet zvogëluar ngadalë
853	Mjekësia e bazuar në hulumtime të dëshmuara ka të bëjë me
854	Si do të definoni studimin e randomizuar
855	Studim tranzverzal/i tërthorë, është
856	Studim rast – kontroll është
857	Studim kohort është
858	Meta-Analiza

859	Kujdesi parësor shëndetsor është një rrjetë e shërbimeve shëndetësore me bazë apo qendër në komunitet, të cilat përfshijnë
860	Mjeku familjar ka rol shumë të rëndësishëm në mbrojtjen shëndetësore për shkak të arsyeve vijuese:
861	Veprimet që duhet të ndërmerren gjatë helmimit me preparate
862	Cilat nga shenjat klinike të poshteshënuarat janë të sakta për hypothyroidizmin
863	Ndryshimet laboratorike të hypothyroidizmit janë
864	Mjeku familjar ka rol shumë të rëndësishëm në mbrojtjen shëndetësore për shkak të arsyeve vijuese:
865	Fëmija i lindur me cephalohematom është në rrezik të shtuar për
866	Trajtimi adekuat për cephalohematom duhet të jetë
867	Cilat nga veprimet në vijim bëjnë pjesë në menaxhimin adekuat të foshnjës së shëndoshë me peshë të vogël
868	Cilat nga shenjat e poshtë shënuara paraqesin rrezik për të porsalindurin
869	Luani është një foshnje 3 ditëshe me përhapje të të skuqurit të umbilikusit në abdomen. Cilat nga procedurat duhet përfshirë në trajtimin e tij
870	Tringa është 4 muajshe me sy të skuqur dhe me sekret qelbi nga sytë. Përndryshe ajo është shëndetmirë. Cili është trajtimi adekuat?
871	Cilat nga gjendjet e poshtëshënuara paraqesin kontraindikacion për ushqyerje në gji
872	Cilat nga shenjat e poshtëshënuara janë shenja të përngjitjes së mirë gjatë ushqyerjes në gji
873	Cilat nga shenjat e poshtëshënuara janë shenja të besueshme se foshnja nuk ushqehet mjaft me qumësht të gjirit
874	Cilat nga deklaratat e poshtëshënuara lidhur me ushqimin plotësues janë të vërteta
875	Cilat nga rastet e poshtëshënuara do t'i vaksinonit sot
876	Cilat nga shenjat e poshtëshënuara paraqesin shenjë gjeneralë të rrezikshme për fëmijët e moshës 2 muaj deri 5 vjeçare
877	Burimi është 3 vjeçar dhe ka dhimbje të fytit. Ai ka temperaturë 38°C, eksudat të bardhë në fyt dhe gjëndra limfatike të rritura dhe të dhimbshme. Nuk është alergjik në penicillin. Trajtimi adekuat është:
878	Bajrami është 3 vjeçar, ai ka temperaturë 38.8°C dhe qafë të shtanguar. Cilat nga procedurat e poshtëshënuara bëjnë pjesë në trajtimin adekuat të këtij rasti?
879	Cilat nga veprimet e poshtëshënuara janë adekuate gjatë këshillimit dhe mësimit të nënës
880	Genci është 4 vjeçar, ai ka diarre jo të gjakosur. Ai është aktiv, pinë normalisht, turgori normal dhe sytë nuk i ka të futura në gropë. Cili është trajtimi inicial adekuat
881	Cila shenjë pëdoret për klasifikim të pneumonisë, në bazë të MISF* (IMCI)?
882	Për të klasifikuar fëmijën me temperaturë si morbil, në bazë MISF (IMCI), cila nga shenjat e poshtëshënuara duhet të ekzistojnë
883	Parametrat normale të rritjes për foshnjën 2 deri 6 muajshe janë

884	Cila është pyetja më e mirë për kontrollimin e të mbajturit në mend të këshillave të dhëna për marrje të shtuar të lëngjeve gjatë diarresë
885	Diarre perzistente është diarrea e cila zgjatë më shumë se
886	Cila është frekuenca respiratore normale për fëmijën 12 muajsh
887	Arta është 2 vjeçare dhe ka diarre. Ajo është letargjike me sy të futura brenda (në gropë) dhe nuk pinë. Cili kishte me qenë klasifikimi adekuat?
888	Cila është metoda adekuate e numërimit të respiracioneve të fëmijës
889	Ekzaminimi fizik i një adoleshenti tregon për rritje të skrotumit dhe testisit. Lëkura e testisit është skuqur dhe ka ndërruar sipërfaqen. Penisi është rritur fare pak ose aspak. Stadi korrekt i Tanner-it për zhvillim të pubertetit për këtë rast është:
890	Një grua e cila është në javën e 24-të shtatzënësisë vie në klinikën tuaj. Kjo është vizita e saj e dytë. Ajo ka sjell me vete rezultatet e analizave të gjakut të cilat ju i keni kërkuar në vizitën e parë. Analizat tregojnë se ajo ka grupin e gjakut O negativ. Veprimi adekuat kishte me qenë:
891	Në cilën moshë të gestacionit fillon t'i ndiej lëvizjet e frytit gruaja e cila më parë kurrë nuk ka qenë shtatzënë
892	Cila nga përgjegjet e poshtëshënuara ndikon në inkurajimin e femrës për të ardhë në vizita përcjellëse
893	Duhet të dyshohet për shtatzënësi ektopike tek gruaja e cila prezenton me të gjitha ankesat e poshtëshënuara. PËRVEÇ:
894	Të gjitha gratë shtatzëna duhet të këshillohen që të ndërprejnë pirjen e duhanit si dhe të mos qëndrojnë në ambient ku ka tym duhani. Kjo bëhet për shkak të efekteve të mundshme të duhanit të cilat përfshijnë
895	Cila nga gjendjet e poshtëshënuara është shkaktare e konvulzioneve në shtatzënësi:
896	Lloji më i shpeshtë i anemisë gjatë shtatzënësisë është
897	Tetanus vaksina duhet t'u jipet:
898	Vlerat e TA të cilat shfytëzohen për definim të hipertensionit në shtatzënësi janë:
899	Abrupcioni i placentës ndërlidhet me:
900	Gjatë vizitës post-natale në javën e gjashtë, ju duhet të kontrolloni nënën për
901	Cilat komplikime të laktacionit duhet të referohen
902	Ju vizitoni gruan e cila është rrahur nga ana e burrit të saj. Ju do të
903	Injeksionet e kontraceptivit Depo-Provera duhet të jipen
904	Frekuenca dhe ndjenja e shpeshtë për të urinuar janë shenja të:
905	Pas fillimit të laktacionit, kujdesi ditor normal për gjinjë përfshinë:
906	Cilat nga grupet e poshtëshënuara të grave janë adekuate për IUD:
907	Cilat sëmundje tjera bazë ndërlidhen me kandidiazën vaginale
908	Cilat janë kriteret e referimit për sëmundjet inflamto-re të pelvikut
909	Cilat nga metodat e poshtëshënuara të kontracepcionit mund të mbrojnë nga STS-të/ HIV-i / AIDS-i
910	Femra e cila përdor tableta të kontracepcionit, mund të ketë
911	Cilat infeksione nuk transmetohen seksualisht

912	Cilat nga STS-të e poshtëshënuara mund të parandalohen me përdorimin e kondomit
913	Cilat nga gjendjet e poshtëshënuara janë shkaktare të amenorrese sekondare
914	Cilat janë sekuelat e sëmundjeve infektore të pelvikut
915	Një grua vjen në klinikë dy ditë pasi që është dhunuar. Ju do të
916	Cilat pjesë konsiderohen si relevante për anamnezën gjinekologjike/obstetrike
917	Cilat nga metodat e poshtëshënuara të planifikimit familjar mund të shfrytëzohen për kontracepcion emergjent post-coitus
918	Cilat defekte të lindura mund të prevenohen
919	Gjatë shtatzënisë, gjakderdhja vaginale mund të jetë pasojë e
920	Cila nga gjendjet e poshtëshënuara mund të shoqërohet me këto simptoma: vertigo, dhimbje në gjoks dhe probleme të frymëmarrjes
921	Cilën nga të poshtëshënuarat do ta përfshinit në këshillimin e pacientit i cili vuan nga insomnia
922	Cilat nga të poshtëshënuarat paraqesin tiparet diagnostike të demencës
923	Cilat nga të poshtëshënuarat përfshihen në diagnozën diferenciale të deliriumit
924	Cilat nga barërat e poshtëshënuara mund të indikohen në trajtimin e alkoolizmit
925	Cilat nga të poshtëshënuarat paraqesin shenjat kardinale të abuzimit të drogave
926	Cilat nga të poshtëshënuarat paraqesin tiparet diagnostike kryesore të psikozës akute
927	Cilat nga të poshtëshënuarat janë tipike për fazën manike të çrregullimit bipolar
928	Cilat nga të poshtëshënuarat paraqesin efektet anësore të barnave neuroleptike
929	Cilat nga të poshtëshënuarat paraqesin tiparet diagnostike të depresionit
930	Cilat nga të poshtëshënuarat janë pjesë e menaxhimit të pacientit me disfunktion erektil
931	Cilat nga të poshtëshënuarat paraqesin tiparet e pacientit me çrregullime të ngrënies
932	Cilat nga të poshtëshënuarat paraqesin simptomat e anorexia nervosa
933	Çrregullimet depressive zakonisht shoqërohen me:
934	Sa i përket pikëllimit pas humbjes së madhe (vdekjes)
935	Sa i përket varshmërisë nga Benzodiazepinet:
936	Depresioni në fëmijëri
937	Agjitimi tek një 75 vjeçar mund të jetë i shkaktuar nga:
938	Varshmëria nga alkooli shoqërohet me
939	Çrregullimi i stresit post-traumatik (ÇSPT) shoqërohet me:
940	Efektet anësore të antidepressivëve triciklikë shoqërohen me:
941	Lëndimi i qëllimshëm i vetëvehtes
942	Cilat nga të poshtëshënuarat paraqesin elemente që duhet marrë në konsideratë kur bëjmë zgjedhjen e terapisë farmakologjike

943	Sa i përket rolit të personelit që ofron kujdes primar në shëndetin mental, cilat nga të poshtëshënuarat janë të vërteta
944	Cilat nga të poshtëshënuarat janë pjesë e shërbimeve të ofruara nga qendra e shëndetit mental në komunitet
945	Kur bëhet reanimimi kardiopulmonar
946	Tek shoku hipovolemik
947	Cilat deklarata lidhur me helmimin janë të sakta ose të pasakta
948	Tek të moshuarit
949	Cilat deklarata lidhur me skreningun janë të sakta ose të pasakta
950	Cilat deklarata lidhur me diabetin janë të sakta ose të pasakta
951	Cilat deklarata lidhur me trajtimin e njerëzve me diabet janë të sakta ose të pasakta
952	Monitorimi i diabetit përfshin
953	Cilat deklarata lidhur me komplikimet e diabetit janë të sakta ose të pasakta
954	Cilat deklarata lidhur me hipertensionin janë të sakta ose të pasakta
955	Cilat deklarata lidhur me trajtimin e hipertensionit janë të sakta ose të pasakta
956	Gjatë trajtimit të hipertensionit
957	Cilat deklarata lidhur me komplikimet e hipertensionit janë të sakta ose të pasakta
958	Cilat deklarata lidhur me dispepsinë janë të sakta ose të pasakta
959	Helicobacter pylori
960	Cilat deklarata lidhur me hepatitin janë të sakta ose të pasakta
961	Cilat deklarata lidhur me infeksionin e traktit urinar janë të sakta ose të pasakta
962	Proteinuria
963	Cilat deklarata lidhur me trajtimin e pacientëve me sëmundje reumatike janë të sakta ose të pasakta
964	Te infeksionet e lëkurës
965	Cilat janë kriteret e diagnostikimit për astmën bronkiale perzistente të lehtë
966	Cili është bari i cili në përgjithësi rekomandohet si bar i zgjedhjes së parë tek bronkiti kronik obstruktiv
967	Cilat barna mund të zgjedhen tek pneumonia (e pakomplikuar) në praktikën e përgjithshme
968	Tek cilat sëmundje nevojitet trajtimi me antikoagulant (Varfarin)
969	Shkaku më i shpeshtë i insuficiencës së zemrës është
970	Cilat komponente janë aterogjene
971	Mënyrë e mirë për t'i ndihmuar pacientit i cili është shumë i brengosur për simptomat e tij është
972	Mënyra më e mirë e menaxhimit të pacientit i cili kërkon ta vizitoj specialistin është që mjeku të
973	Kujdesi paliativ
974	Te kokëdhimbjet
975	Meningjiti
976	Tek insulti cerebrovaskular

977	Trajtimi medikamentoz i sëmundjeve të gjëndres tireoide duhet
978	Disfunksioni i tireoidesë duhet të merret në konsiderim kur ekziston
979	Hepatomegalia mund të haset te
980	Tek infeksionet
981	Trajtimi i otitis media sekretues përfshin
982	Menaxhimi i barotraumës së veshit përfshin
983	Referimi urgjent në repartin e ORL-së është i nevojshëm pas frakturës së kockës nazale, përveç te
984	Menaxhimi i paralizës së Bell-it përfshinë
985	Indikacionet absolute për tonsillektomi
986	Adenectomy është operacion:
987	Akomodimi është proces gjatë të cilit:
988	Lingu uxor i syrit formohet nga:
989	Malformacionet ndodhin në:
990	Prania e eksudatit qelbor në nyje quhet:
991	Kontraktura është:
992	Osteotomia është procedure kirurgjike e
993	Ulcera peptike është sëmundje e
994	Nxitesi më i fuqishëm i sekrecionit të acidit gastrik është
995	Metodat e mjekimit të sëmurit me astmë bronkiale janë
996	Barnat që përdoren për mjekimin e astmatikeve janë
997	Anemia pernicioze është pasojë e deficitit të
998	Organizmin e mbrojnë nga infeksionet
999	Bakteriuri asimptomatike quhet kur
1000	Për urinokulture merret
1001	Mikrohëmaturia është kur pas centrifugimit të urines në fushë mikroskopike gjenden
1002	Oligoartriti është artriti me lokalizim në
1003	Cila nga gjendjet vijuese e shkakton edemën mushkerore
1004	Sa është frekuenca respiratore normale tek fëmijet e moshës një vjeçare
1005	Me anoreksi nervoze nënkuptojmë
1006	Antidoti tek helmimet me preparate organofosforike është
1007	Asfiksioni perinatal është pasojë e
1008	Hemofilia B është pasojë e mungesës së
1009	Simtomet kryesore klinike të Morbus celiacus
1010	Cili është simptomi klinik i stenozës hipertrofike të pilorit
1011	Cili është kriteri minor sipas Jones-it për Febris Rheumatica
1012	Edhja hemoragjike Kriem-Kongo bartet përmes
1013	Cili virus është shkaktar më i shpeshtë i sëmundjes së zemrës
1014	Rritja e temp. për 1 grad Celsius pulsi i zemrës shpejtohet

BQESP në bashkëpunim me Komitetet specialistike dhe Katedrat e Fakultetit të Mjekësisë ka përpiluar listën e pyetjeve për përgatitjen e testit kualifikues për konkursin e specializimeve.

Kjo listë është përgatitur për të ju lehtësuar kandidatëve procesin e përgatitjes për testimin kualifikues.

Testi do të përmbajë përafërsisht 90% të pyetjeve nga kjo listë.

Nr	Pyetjet per Stomatologji
1	Cilat struktura anatomike e formojnë stomatodeumin
2	Pse gjatë rritjes maksilla dislokohet poshtë dhe përpara
3	Deri kur ekziston ind lidhor në strukturat në simfizën e mandibullës
4	Ngritja e parë fiziologjike e kafshimit vjen me daljen e
5	Cilin funksion neurovegjetativ subtil të diferencuar lartë e ka përvetësuar njeriu
6	Cila nga këto paraqet lëvizje rreth boshtit horizontal te dhëmbit
7	Cila nga këto paraqet lëvizje rreth boshtit vertikal te dhëmbit
8	Distokluzioni dhe proinklinimi i frontit maksillar janë veçori të
9	Te klasa II/1 vargu dentar maksillar është
10	Veçori themelore e përbashkët e të gjitha formave të klasës së III-të sipas Angle-it është
11	Te kafshimi i dhunshëm progen në qetësinë fiziologjike simptomat e kafshimit progen
12	Sa muskuj çift marrin pjesë në grupin e muskujve mastikatorë
13	Cilat janë mënyrat e trashëgimisë
14	Forma e kafkës dhe fytyrës vlerësohet me
15	Rentgengrafia e dorës bëhet për vlerësimin e
16	Laku i Spee-ut është i theksuar te
17	Buzëqeshja gingivale vërehet te malokluzionet
18	Abrazioni i tehut incizal dhe faqes labiale të incizivëve maksillar dhe i tehut incizal dhe faqes linguale të incizivëve mandibular është veçori e
19	Te kafshimi i thellë i vërtetë në qetësi fiziologjike hapësira interokluzale është
20	Nëse në profil të pacientit protuberantio mentalis dhe spina nasalis posterior janë të tërhequra prapa, anomalia është
21	Në okluzion qendror nuk mund të vendoset kontakt në mes të incizivëve te
22	Makroglosia dhe hiperaktiviteti i gjuhës paraqitet te
23	Gjatë spostimit ortodontik të dhëmbëve kur përdoret forcë e mjaftueshme dhe optimale, në anën e komprimimit
24	Ankorimi (spiranca) paraqet

25	Cila nga këto nuk është aparat ortodontik
26	Cili lloj i aktivatorit përdoret për terapi të kafshimit të hapur dentoalveolar, që stimulon rritjen e incizivëve
27	Kur formohen molarët e parë të përhershëm
28	Për okluzionin normal duhet të përdoret termi
29	Vendosja e dhëmbëve në vargje dentare në mënyrë të dendur paraqet
30	Humbje e parakohshme e dhëmbëve të qumështit konsiderohet
31	Koha normale e fillimit të daljes së dhëmbëve të qumështit është
32	Trajtimi atraumatik restaurativ (ART)
33	Odontogjeneza e dhëmbit fillon rreth javës
34	Zhvillimi i rrënjës së dhëmbit fillon
35	Në kohën kur dhëmbi arrin pozitën e tij funksionale formohet
36	Me daljen e dhëmbit përfundon cikli jetsor i
37	Te forma hipoplastike e amelogenesis imperfekta
38	Te caries profunda complicata ndryshimet që paraqiten në pulpë janë
39	Te pulpitis acuta purulenta totalis hiperemia në periodoncium është e karakterit
40	Mjekimi i periodontiteve apikale te fëmijët kur nuk është kryer formimi i rrënjës
41	Mendohet se shkaktar të paraqitjes së gingivitis fibromatica janë
42	Karakteristikë e Paradontopatisë juvenile është
43	Menjëherë pas traumës së dhëmbit testet e vitalitetit
44	Punimet protetike te fëmijët duhet të bëhen
45	Kur mollari i parë permanent indikohet të ekstrahohet koha me optimale për ekstrahimin e tij është
46	Nëqoftëse dhëmbi i mbinumërt duhet të largohet në mënyrë kirurgjike, intervenimi duhet të kryhet
47	Flegmona e dentogjene është
48	Sipas qëndrimit bashkëkohor kariesi është sëmundje infektive multikauzale reverzibile e mvarur nga ushqimi
49	Kohëzgjatja më e shkurtër për pastrimin efikas me brushë të të gjitha pjesëve retinuese dhe sipërfaqeve të dhëmbit është
50	Fijet e brushës mund të jenë
51	Retencion më të mirë kanë vulosësit
52	Vulosja e fisurave preferohet
53	Metoda horizontale e larjes së dhëmbëve tolerohet
54	Brushimi te fëmijët duhet të përdoret
55	Dhëmbi i qumështit i intruduar
56	Para reimplantimit alveola
57	Rindërtimi me kompozit i kurorës bëhet
58	Te dhëmbët e qumështit lëndimet më të shpeshta janë
59	Mosha ku më së shumti ndodhin traumat dentare te fëmijët janë
60	Dislokimi palatinal i kurorës së dhëmbit të qumështit

61	Slot preparimi i takon preparimit të klasës
62	Shpërlarja e kanalit duhet të bëhet me
63	Niveli i obturimit definitiv pas trajtimit të kanalit të infektuar duhet me qenë
64	Preparatet në bazë të paraformaldehidit të cilat përdoren për obturim të kanalit janë
65	Pjesën periferike të pulpës e përbëjnë qelizat
66	Diagnoza e sigurt ndërmjet granulomës dhe cystës vendoset me metodat
67	Dhimbjet më intensive të parodontiti akut janë në
68	Karakteristikë për lëngun cistik është prania e
69	Ph e Ca(OH)_2 i cili përdoret në terapinë e caries profunda complicata është
70	Kontraindikacionet për biopulpektomi janë
71	Sipas standardizimit të instrumenteve kanalikulare gjatësia e pjesës punuese të instrumentit është
72	Koncentrimi i tretjes së EDTA-së në përpunimin e kanalit të rrënjës përdoret në koncentrim prej
73	Pasta me përbërje të zink-oksidi eugenolit është
74	Pasta me përbërje të bazë të kalcium hidroksidit është
75	Pasta me përbërje të rezineve është
76	Pasta me përbërje të paraformaldehidit është
77	Koncentrimi i tretjes së Chlorheksidinës në irrigim të kanalit të rrënjës është
78	Koncentrimi i tretjes së NaOCl në irrigim të kanalit të rrënjës është
79	Komponentën organike të kompoziteve e përbënë
80	Kompozitat fotosensitive vendosen në shtresa me trashësi
81	Fortësia e amalgamit është
82	Amalgami amerikan përmbanë
83	Faza Gamma (g) është
84	Faza Gamma 1 është
85	Faza Gamma 2 është
86	Faza terminale e fortësimit të amalgamit zgjatë
87	Dëmtim traumatik i klasës së II-të është
88	Dëmtim traumatik i klasës së III-të është
89	Zhvillimi i cementit fillon kur
90	Dentina kuaternere-medikamentoze karakterizohet me
91	Diametri i prizmave të smaltit sillet prej
92	Cila është trashësia e predeutinitës
93	Formimi i dentinës reparatore pas aplikimit të medikamentit fillon në
94	Sterilizimi i instrumenteve me ajër të thatë shkatërron mikroorganizmat
95	Overlay është mbushje e shkrire që mbulon
96	Gingiva ngjyeshme është më e gjërë në regjionin
97	Shtresa kornifikuese është prezente te

98	Regjenerimi i qelizave epiteliale ndodh në shtresën
99	Trashësia e epitelit ngjitet është më i madhe
100	Organeli qelizor për të forcuar lidhshmërinë e qelizave fqinje të epitelit ngjitet quhet
101	Procesi i daljes permanente e dhëmbit realizohet nga deponimi i shtresave të
102	Zhiva avullohet në temperaturën
103	Hapësira periodontale është me e gjerë në të tretën
104	Prej 100 gramëve të pështymës
105	Çimentoja acelulare është më e pranishme në të tretën
106	Njollat e FORDAJISIT janë të pranishme në
107	Gingiviti kataral manifestohet me ndyshime inflamatore
108	Gingiviti fibromatoz manifestohet me ndyshime inflamatore
109	Papillat muratore qarkore (papillae circumvallatae) janë në numër
110	Testi disolvoalergjen është
111	Indeksi PDI sipas Ramfjordit është indeks për vlerësimin e gjendjes së
112	Pozicioni teh mbi teh i dhëmbëve të poshtëm me ata të sipërm quhet
113	Cilat nga proceset patologjike nuk veprojnë si vatër orale
114	Shkenca që merret me studimin e ndikimit të forcave në dhëmbë dhe në parodontiumi është
115	Gingiviti ulcero-nekrotik shkaktohet nga mikroorganizmat
116	Kontakti i dhëmbëve të nofullës së sipërme dhe të poshtme gjatë lëvizjes quhet
117	Erozioni (erosio) është efloreshencë
118	Simptoma klinike patognomonike e parodontopatisë është
119	Papilitis paraqet inflamimin
120	Për largimin gurit të dhëmbit përdoret
121	Tipi i resorbimit kockor të xhepi parodontal infrakockor është
122	Njëra nga teoritë e shkakimit të sëmundjeve konsekuative është
123	Veprimi i forcave horizontale tentojnë e dhëmbit
124	Frekuenca më e shpeshtë e leukoplakisë është në mes të moshës
125	Histamina që përdoret në testin për të dëshmuar alergjinë është më zbutje
126	Mukoza e sinusit maksillarë është e inervuar nga
127	Nyjet limfatike të kokës dhe qafës drenohen direkt në
128	Gjendrës pështymore submandbulare i takon
129	Në spina mentalis të mandibullës ngjiten këta muskuj
130	Me aplikimin e anestezionit për n. nasopallatinus Scarpe, anestezohet
131	Antibiotikët përdoren tek
132	Cistat reziduale janë
133	Mpirja e buzës së poshtme tek osteomieliti akut i nofullës së poshtme paraqet
134	Plastika e sinusit maksillarë me lambo bukale sipas Eassmundit aplikohet te

135	Zhermektomia nënkupton
136	Cista zhvilluese janë
137	Te hemofilia A, egziston deficit i faktorit
138	Për bllokadë periferike përdoret
139	Faza trombocitare e hemostazës fillon me
140	Leukoplakia është
141	Dhëmbi i ekstrahuar në mënyrë traumatike deri në momentin e replantimit mund të ruhet
142	Te pacientet me hemodialize ekstraksioni i dhembit mund të bëhet
143	N. nazociliarë është degë sensitive e
144	Fenomeni i paralaksës përdoret për të caktuar pozitën e saktë të
145	Antibiotikët bakteriostatik janë
146	Ranula është lezionistik me prejardhje nga
147	Cistat folikulare janë lezione të cilat zhvillohen
148	Marsupializimi i cistës nënkupton
149	Nëse gjatë nxjerrjes së rrënjës së mbetur të molarit të tretë të poshtëm, rrënja zhduket nga shikimi, ajo mund të jetë
150	Denudimi nënkupton
151	Te hemofilia B, egziston deficit i faktorit:
152	Zona e kondensimit të indit kockorë nuk është prezente te
153	Neurektomia nënkupton
154	Me aplikimin e anestezionit për n. nasopallatinus Scarpe, anestezohet
155	Dallimi mes plazmës dhe serumit është se
156	N. bucal është degë e nervit
157	Xerostomia është
158	Pacientat të cilët vin për trajtim me proteza totale ndahen në
159	Faktoret e retensionit janë
160	Me kohezion kuptojmë
161	Pllaka mund të reduktohet në
162	Gjërësia e zonës kufitare është
163	Kufiri i protezes totale duhet të shtrihet deri në
164	Nofulla e poshtme është shume e ekspozuar nga ndikimi i
165	Te proteza e poshtme është me rëndësi
166	Në nofullën e poshtme pllaka në anën linguale
167	Në regjionin e dhëmbëve anësor bedemi duhet të jetë paralel me
168	Hapsira okluzale është
169	Kreshta alveolare në mandibull gjatë resorbimit
170	Forcat të cilat ndikojnë në indet bartëseduhet të kenë drejtim kryeshisht
171	Te ngacmimet e forta (p.sh.dhimbja)
172	Rezistenca e urës ndaj lakimit varet
173	Tuberkulat funksional janë
174	Porcelani tkurret gjatë pjekjes dhe kjo tkurrje mund të jetë

175	Krosheja e derdhur te proteza e skeltuar duhet ta kapërthejë dhëmbin retinues deri në
176	Llojet e lugës individuale janë
177	Me retencion të protezës nënkuptojmë
178	Cementet kanë karakteristika të caktuara, njera prej tyre është
179	Glass yonomer cementet ndahen në
180	Porcelani përbëhet nga
181	Rrëshirat artificiale apo sintetike janë
182	Si materiale për modelim përdoren kombinime të ndryshme
183	Në elementet e sistemit orofacial nuk bën pjesë
184	Klasa III sipas Angle-it paraqet
185	Numri i dhëmbëve në të dy vargjet dentare është
186	Te klasa I sipas Angle-it (kafshimi eugnat)
187	Serumi nuk përmbanë
188	Gingivostomatiti herpetik shkaktohet nga
189	Rruget e transmetimit te virusit te hepatitit B jane
190	Erizipela shkaktohet nga
191	Poliomieliti shkaktohet nga
192	Nderlikimet pas streptokokozave jane
193	Dizenteria bacilare shkaktohet nga
194	Forma më e dëshirueshme e dhënies së gjakut është dhurimi
195	Terapia standarde e zgjedhjes së parë për shërimin e angines streptokoksike është
196	Kompleksi primar tek tuberkuloza primare përbëhet prej
197	tek profilaksa kronike e kontinuar e konvulzioneve febrile përdoret
198	Doza e insulinës me veprim të shpejtë (Insulin kristal) tek ketoacidoza diabetike, në kg të masës trupore është
199	Hemofilia A trashëgohet në mënyrën
200	Terapia standarde e zgjedhjes së parë për shërimin e etes reumatizmale është
201	Konvulzionet febrile janë si pasojë e
202	Profilaksa kronike kontinuele e konvulzioneve febrile me Fenobarbiton bëhet në dozë prej
203	Anemia pernicioze është si pasojë e mungesës së
204	Si dozë terapeutike e anemisë sideropenike përdoren kripërat e fero- sulfatit në dozë prej
205	Profilaksa e anemisë sideropenike bëhet me dozë të preparatit të Fe prej
206	Hemofilia B është si pasojë e mungesës së
207	Mungesa e plotë e aurikulës quhet
208	Te pezmatimet e veshit të brendshëm, membrana timpanale është
209	Çka e dallon paralizën qendrore të nervit facial nga ajo periferike
210	Prezenca e gjakut në veshin e mesëm quhet

211	Tympanoplastika nënkupton
212	Çka është paracenteza
213	Riniti idiopatik-vazomotor është
214	Cellulitis orbitae është komplikim
215	Esenca e kirurgjisë funksionale endoscopike të sinusëve (FESS) është
216	Diagnostikimi më i saktë i frakturave të kockave nazale bëhet me
217	Sinuset të cilët drenohen në meatus nasi medius janë
218	Simptomat karakteristike të devijacioni i hundës janë
219	Abscessus peritonsillaris manifestohet me
220	Me tonzillektomi nënkuptohet
221	Inflamacionet e gjëndrave pshtymore quhen
222	Trupat e aspiruar në traktin respirator nxirren me
223	Ndihma e parë të lëndimet e hapura të laringut
224	Mbetja e kafshatës së madhe në lumenin e laringut shkakton
225	Trakeotomia bëhet në
226	Papilloma të të rriturit ka mundësi alterimi malinj
227	Mikroorganizmat të cilët për zhvillim kërkojnë sasi të vogël të oksigjenit të lirë quhen
228	Toksina me natyrë proteinike e prodhuar nga mikroorganizmi dhe i ekskretuar në ambientin përreth është
229	Aminoglikozidet veprojnë duke
230	Cili mikroorganizëm predominon si shkaktar i kariesit
231	Prania e kolinës është unike dhe luan rol më të rëndësishëm rregullator në hidrolizën e murit qelizor (autolizës). Kjo lidhet me
232	Qelizat që konsiderohen qeliza bazë për imunitetin e lindur lidhen me
233	Cilët nga mikroorganizmat e poshtëshënuar konsiderohen strict anaerob
234	Cili nga viruset e poshtëshënuar nuk barten me rrugë fekalo-orale
235	Ushqimi për organizmin e njeriut ka rol
236	Stomatiti angular është pasojë e mungesës së vitaminës
237	Nevojat fiziologjike ditore për ujë janë
238	Masat mbrojtëse të aerondotjes janë
239	Klorizimi i ujit është metodë
240	Vitamina K merr pjesë në
241	Uji nga shtresa e parë nëntoksore lejohet për pije nëse
242	Stresi rritë nevojat për vitaminën C
243	Plumbi e kalon barierën placentare
244	Sëmundje ngjitëse të traktit të frymëmarrjes janë
245	Cilët persona konsiderohen mikrobartës kronik-hedhin mikroorganizma
246	Cili nga opsionet për tulareminë është i saktë
247	Vaksina orale e polios është vakcina virale e
248	Cilat vakcina japin imunitet më të qëndrueshëm pasvaksinal

249	Vaksinat me përbërje anatoksike janë kundër
250	Vaksina kundër hepatitit B është në formë pluhuri
251	Për shkak të karakteristikave të virusit, hepatiti B është sëmundje më e lehtë se infeksioni HIV/AIDS
252	Imuniteti i fituar natyral pasiv vjen si rezultat
253	Karantina aplikohet te
254	Në vetëdijesimin e popullatës propaganda ka rëndësi
255	Cilat janë mjetet edukativo shëndetësore
256	Tregues të kualitetit të veprimtarisë shëndetësore spitalore janë
257	Nevoja psikike dhe fizike për vazhdim të marrjes së substancës quhet
258	Nevoja për rritje sasiore të substancës së marrë që të arrijë efektin e dëshiruar quhet
259	Psikoza apo crregullimi psikotik nënkupton
260	Tentim vetëvrasjet janë më të shpeshta te
261	Anoreksia nervosa është
262	Pedofilia nënkupton kontaktin seksual
263	Fobia sociale është
264	Crregullimi i stresit pas traumës paraqitet
265	Frika e pabazuar se personi vuan nga ndonjë sëmundje serioze quhet
266	Për të diagnostikuar prapambetjen mendore nevojitet
267	Eritropoetina krijohet në
268	Trombocitopenia mund të shkak të
269	Niveli I ulur I fosfatazes alkaline në leukocyte, haset tek
270	Vitamina B12 absorbohet në
271	Kardiomiopati në përgjithësi ndahen në
272	Hipertensioni ndahet në
273	Diagnoza e infarktut akut të miokardit vendoset në bazë të
274	Diabeti mellitus tip 2 paraqitet
275	Hipertireoza parësore karakterizohet me
276	Sëmundja e Adisonit karakterizohet me
277	Testi Coombs përdoret për përcaktimin e
278	Linfocitet T rolin mbrojtës të tyre e kryejnë përmes
279	Histamina është
280	Imunodeficiencat ndahen në
281	Temperatura është simptomë e
282	Temperatura kontinuale është kur dallimi I temperaturës brenda ditës është
283	Në bazë të lëvizjes së temperaturës gjatë sëmundjes kemi temperatura
284	Inkubacioni është
285	Te cila nga këto sëmundje paraqitet më shpesh herpes febrilis
286	Skarlatina shkaktohet nga
287	Erizipella
288	Cila nga këto sëmundje është sëmundje ekzantematike

289	Epstein Barr virusi shkakton
290	Shkaktari I polimielitit bënë pjesë në grupin e viruseve
291	Virusi herpes simplex 2 atakon më së shpeshti
292	Meningjiti tuberkular karakterizohet me ndryshime biokimike në likuor
293	Hepatiti A përhapet me rrugë
294	Për cilën formë të hepatitit nuk ka vaksinë mbrojtëse
295	AIDS trajtohet me
296	Shkaktar I scabies-it është
297	Candidiasis mund të lokalizohet në
298	Shkaktar I scrophulodermas është ky tip I bacilit
299	Herpes simplex recidivans mjekohet me
300	Shenjat kryesore të herpes zoster janë
301	Te angioedema procesi alergjik zhvillohet
302	Dermatozat profesionale janë të natyrës alergjike
303	Efloreshenca karakterisitke te pemfigusi vulgar është
304	Keloidi është pasojë e
305	Melanoma malinje është trajta më e rrezikshme e karcinomës së lëkurës dhe paraqitet
306	Acne oleinica shkaktohen për shkak të
307	Alopecia areata është
308	Treponema pallidum shkakton
309	Cerviciti gonorroik akut manifestohet me
310	Lëndimet e unazave të qafës mund të jenë pasojë
311	Komocioni I trurit është
312	Gjakderdhja epidurale manifestohet me tri simptome karakterisitike
313	Pneumotoraksi spontan primar ndodh
314	Iskemia cerebrale fillon nëse shtypja perfuzive e trurit është
315	Lëndimet e rektumit të përcjellura me vdekshmëri të lartë janë
316	Ruptura e uretrës klinikisht manifestohet me
317	Lëndimet traumatike të vena cava inferior përcillen me gjendje
318	Ndërlikimi më I rëndë I splenektomisë është
319	Shkalla e dytë e djegies ka këto shenja
320	Ileusin strangulativ e shkaktojnë
321	Duke marrë parasysh lëndimet e qafës cila prej këtyre është e vërtetë
322	Aspirimi I trupave të huaj më së shpeshti ndodh në grupmoshat
323	Shoku neurogjen
324	Hemofilia B është sëmundje trashëguese që trashëgohet përmes
325	Te indeksi i pllakut dental sipas Silness-Loe vlerësimi bëhet prej
326	Cili është përbërësi kryesor i substances themelore ekstracelulare të periodonciumit
327	Doza e penicilinës për një aplikim me elektroforezë, te terapia e gingivitis është
328	Fundin e sulkusit gingival e formon

329	Xhepat parodontalë zbulohen me
330	Lamina propia e mukozës së gingivës përbëhet nga
331	Në çfarë koncentrimi terapeutik përdoret Chlorhexidin Gkuonati si antiseptik oral
332	Me çfarë lloj mukoze është e mbështjelur sipërfaqja ventral e gjuhës
333	Sa është përqindja e H ₂ O në ndërtimin e kockës alveolare
334	Harku i dhëmbëve në të dy nofullat te indeksi CPITN ndahet në
335	Testi i Tzank-ut shërben për vërtetimin e diagnoses së
336	Testi i Schelly-it është test ekstrakorporal për vërtetimin e alergjisë dhe quhet edhe
337	Vija e demarkacionit është
338	Rezistenca e urës ndaj lakimit është në
339	Padhambësia parcialet Kenedi-2 është
340	Sistemi Pindeks është
341	Retencioni i kurorave teleskopike realizohet nëpërmjet
342	Luga individuale të mbarimi i protezave totale shërben për
343	Rolin kryesorë gjatë pranimit dhe amortizimit të forcave okluzale e luan
344	Modeli anatomik në protetikën fikse shfrytëzohet për
345	Dhëmbët shtyllë janë
346	Indi lidhës i dhëmbit më së miri i përballon forcat që kanë kahje paralele me
347	Rindertimet
348	Gjatë radhitjes së dhëmbëve anësor të poshtëm së pari vendoset
349	Për mbulimin elektrolitik sipërfaqësor të modelit, në protetikën fikse përdoret
350	Gjatësia e kultit të rindërtimit bashkë me pjesën e mbetur të substancës së dhëmbit , duhet të jetë sa
351	Njëra nga karakteristikat themelore që duhet të plotësojë kanali për derdhje është se diametri i kanalit duhet të jetë më i vogël ose i njëjtë me trashësinë më të madhe të murit të modelit të dyllit
352	Fluktuacioni si fenomen paraqitet te
353	Fenomeni i krepitacionit është karakteristike
354	Orificiumi i duktus Stenoni , i korespondon regjionit të
355	Sinkopa është
356	Fenomeni i Vincentit paraqet
357	Nëse komunikimi oroantral mbyllet me paketim me jodoform gazë, ajo largohet pas
358	Angiogeneza pas nxerrjes së dhëmbit fillon
359	Mukoza e sinusit maksillarë është e inervuar nga
360	Koha e protrombinës është
361	Komunikimi orontral mbyllet me paketim me jodoform gazë nëse
362	Në dhimbje vaskulare bën pjesë
363	Metoda e kontrollës së sterilizimit me letërën e Mikulichit është metodë:
364	Koha e gjakderdhjes është:

365	Alveoloplastika nënkupton:
366	Zhermektomia nënkupton:
367	Hiatus maksillaris ndodhet në :
368	Muskujt mimik inervohen nga degët e nervit kranial:
369	Me aplikimin e anestezionit për n. bukal djathtas, anestezohet
370	Nëpër gjëndrën parotide kalon:
371	Osteomieliti është infeksion i cili fillon në :
372	Fenomeni i Dipidrenit është karakteristikë e :
373	Nga infeksionet me prejardhje nga incizivët e poshtëm reagojnë nyjet limfaike:
374	Trizmusi është më tepër i shprehur te infeksionet e regjionit :
375	Muskujt mastikatore inervohen nga degët e nervit :
376	Në cilët dhëmb shfaqet më shpesh hiper cementoza:
377	Mundësia e thyerjes së gjypërës është komplikim i mundshëm gjatë:
378	Infeksioni i hapësirës sublinguale më së shpeshti ndodh për shkak të:
379	Cilin nerv lëshon kafkën nëpër foramen ovale :
380	Te gratë shtatzënë kontraindikohe aplikimi i antibiotikut:
381	Sialodohiti është :
382	Perikoroniti është komplikim më i shpeshtë te:
383	Infeksioni i hapësirës sublinguale më së shpeshti ndodh për shkak të:
384	Nëse komunikimi oroantral mbyllet me paketim me jodoform gazë, ajo largohet pas
385	Dhëmbi i ekstrahuar në mënyrë traumatike deri në momentin e replantimit mund të ruhet
386	Nëse pacienti është alergjik në penicilinë cili antibiotik nuk guxon të përdoret
387	Antibiotik bakteriostatik është
388	Ngritja e sinusit maksillarë ndikohet te
389	Zona e kondensimit të indit kockorë nuk është prezente te
390	Gjëndrës pështymore sublinguale i takon
391	Pas marrjes së analizës mikrobiologjike të infeksionit deri në momentin e kultivimit nuk guxon të kalojnë më tepër se
392	Pas ekstraksionit alveola mbushet me ind kockorë, pas
393	Radiografia e hapësirave paranazale përdoret:
394	Cistat e kanalit inciziv janë cista
395	Për përcaktimin e kalkulusit në kanalën ekskretor të gjëndrës submandibulare përdoret:
396	Sasia e përgjithshme e gjakut në trup të njeriut është
397	Hiperplazioni i mukozës që formohet si rrjedhë e protezave jostabile quhet:
398	Vestibuloplastika sipas Obvegezer-it paraqet:
399	Neuralgjia trigeminale paroksizmale (idiopati) karakterizohet me :

400	Koha prej momentit të implantimit të implantit dentar në nofullën e poshtme deri të vendosja e suprastrukturës është:
401	Z-Plastika aplikohet për korigjimin e :
402	Nëse pas ekstarkcionit të dhëmbit me lezion periapikal , ngel pjesë e indit patologjik në nofull , rritja e saj e pavarur do të shkakton formimin e :
403	Fenomeni i paralaksës në radiografi përdoret për diagnostikimin e:
404	Pas korigjimit kirurgjik të fibromatozës së tuberave maksillare, marrja e masës për punim protetikorë duhet të mirret së paku pas:
405	Infeksionet me prejardhje nga incizivët e poshtëm japin limfadenit në gjëndrrat limfatike:
406	Periimplantiti paraqet:
407	Freneloplastika me e pitelizim të lirë ndikohet te:
408	Për bllokadë periferike përdoret:
409	Metoda e kontrollës së sterilizimit me letrën e Mikulichit është metodë:
410	Cili anestetik nuk guxon të aplikohet tek gratë shtatzëna:
411	Faktori Hageman është faktori i :
412	Vetëm me anestezi mandibular mund të nxirret pa dhembje.
413	Pas ekstraksionit alveola mbushet me ind kockorë, pas:
414	Trizmusi pas anestezi është pasojë e :
415	Torus mandibule lokalizohet në
416	Flegmona është:
417	Osteomieliti është:
418	Enuklacioni i cystës nënkupton:
419	Sialodeniti është:
420	Ngritja e sinusit maksillar ndikohet te:
421	Kalcium kloridi dhe kalcium glukonati përdoren si hemostatik:
422	Anestezioni i n. facial mund të ndodhë gabimisht gjatë:
423	Shoku anafilaktik është rezultat i :
424	Antibiotiku të cilin nuk guxojnë ta marrin shtatzanat
425	Felipresina është anestetik që preferohet te
426	Luga individuale për marrjen e masës për punime fikse siguron trashësi të materilait prej
427	Për mbulimin elektrolitik sipërfaqësor të modelit, në protetikën fikse përdoret
428	Gjatësia e kultit të rindërtimit bashkë me pjesën e mbetur të substancës së dhëmbit , duhet të jetë sa
429	Raporti okluzal tuberkul-teh marginal është raporti në të cilin kemi okluzionin e
430	Fletëzat plastike (foliet adaptuese) për izolimin e kultit të punës, shërbejnë
431	Në qoftë se pjerrësia e rugës së kondilit është e ulët, atëherë tuberkulët e modeluar duhet të jenë

432	Nëse e përdorim aliazhin, i cili më parë ka qenë i derdhur, atëherë këtë aliazh duhet
433	Pika më e lartë e modelit të dyllit së bashku me kujin për derdhje, duhet të jetë nën skajin e cilindrit për derdhje, afërsisht
434	Vija e demarkacionit të faqja vestibulare e kurorës së fasetuar, duhet të jetë
435	Te kurorat e pjesërishme ($2/3$, $3/4$) faqja vestibulare e dhëmbit është
436	Gota speciale për derdhje të metalit është e përbërë nga
437	Diametri i shkopinjve të dyllit në bllokun termorezistues është
438	Gjatë punimit të fasetës nga rezina me metodën klasike, opakeri si shtresë e parë duhet të thahet
439	Gjatë mbarimit të kurorës Jacket prej porcelain, fletëzat e puthitura të platinës duhet të shkurtohen në anën
440	Gjatë modelimit të kësulës për kurorë të metal-porcelanit ekzistojnë disa mënyra të modelimit
441	Në bazë të materialeve nga të cilat janë mbaruar urat ndahen
442	Çfarë është e domosdoshme të përfshijë masa të punimet fikse
443	Ateçmenët shërbejnë për
444	Me çfarë materiali mirret masa e antagonistit
445	Modelimi i trupit të urës nënkupton
446	Nëse ndërmjet anëtarëve të mesëm të urës frontale mbeten hapësirat në formë të trekëndëshit më të gjera se sa duhet shkaktohen
447	Për modelimin e urës gjithmonë duhet ta përcjellim
448	Te urat me apendiks anëtari i varur duhet të ketë pozitë
449	Te urat me apendiks, anëtari i varur mund të kompensoj
450	Çka duhet të kontrollohet në model të punës
451	Koha e ngurtësimit të materialit termorezistues varet nga lloji i tij dhe nga madhësia e cilindrit dhe zgjat
452	Sa më i madh që është parakafshimi vertikal
453	Mbrojtja e skajeve të masës funksionale bëhet me
454	Te padhëmbësia subtotale, në nofull kanë mbetur
455	Shala e lirë
456	Dorëza e krosheve vendoset në
457	Qafa e dhëmbëve artificiale në proteza totale, duhet të vendoset
458	Sipërfaqja okluzale e cilindrit të kafshimit në regjionin distal duhet të jetë paralele me
459	Skaji vestibulo-okluzal i cilindrit të sipërm të kafshimit duhet të duket sa milimetra kur goja është e hapur pak
460	Raporti qëndror është
461	Gjerësia mesatare e hapësirës interokluzale është
462	Roli i krahut dhe dorëzës së krosheve është që t' i kundërvihet lëvizjeve
463	Elementet, që i kundërvihen fundosjes së protezës, si dhe mundësojnë përcjelljen e

464	Metoda e muflimit mund të jetë
465	Me riparim të protezës parciale nënkuptohet
466	Krosheja e derdhur te proteza e skeletuar duhet të Okapërthejë dhëmbin retinues deri në
467	Shikuar nga ana incizale, faqet vestibulare të inciziveve të sipërm qëndrorë duhet të jenë larg vijës, e cila kalon nëpër skajin distal të papillës incisive
468	Baza e protezës parciale pllakore duhet
469	Elementet për stabilizim të protezës parciale pllakore janë
470	Në nyjen temporomandibulare kryhen
471	Polimerizimi me kohë të mesme është
472	Përzgjedhja e dhëmbëve të pasëm bëhet duke u bazuar në
473	Derdhja e aliazheve që përmbajn titanium si element duhet të bëhet në kushte
474	Pjesa gingivale e protezës së skelatur përbëhet nga
475	Për shkaqe paradontologjiko- higjienike, skaji i bashkuesit të madh duhet të jetë i larguar nga gingiva marginale e dhëmbëve të mbetur
476	Bashkuesi i dyfishtë përdoret te rastet e padhëmbësisë me
477	Në rrafshin horizontal nëse kreshta alveolare është vertikale, distanca ndërmjet harkut nëngjuhësor dhe kreshtës alveolare duhet të jetë
478	Pjesa stabilizuese e dorëzës së krosheve të derdhur i kundërvihet
479	Tuberkulumet palatinale të dhëmbëve të sipërm duhet të okludojnë me
480	Gjatë radhitjes së dhëmbëve anësor të poshtëm së pari vendoset
481	Si lidhen kurorat e dyfishta për kultin e dhëmbit të dekortikuar
482	Nga elemente e cekura për përcjellje dentare të trysnisë më së tepërmi përdoret
483	Elementet për stabilizim kanë për qëllim t'i kundërvihen forcave
484	Ku ndodhet pjesa stabilizuese e dorëzës së krosheve
485	Cilët janë retinuesit indirekt të protezës
486	Mënjanimi i dyllit nga blloku termorezistent bëhet në temperaturën
487	Dimenzionet e harkut nëngjuhësor janë
488	Rregulla e parë e statikës së urës thotë se
489	Çka është përparësi e vendosjes së dhëmbëve anësorë me ndihmën e kallotës
490	Lëvizjet themelore të mandibulës janë
491	Pjerrtësia e rrugës incizale varet nga
492	Orientuesit kryesorë gjatë caktimit të pozitës së dhëmbëve të sipërm frontal janë
493	Saktësia e mbylljes cervikale të kësulës nuk varet nga
494	Forma e retensionit, me qëllim të kundërvimit të ndikimit të forcave mastikatorë, përcaktohet nëse gjatë preparimit formohen së paku
495	Kur kariesi përfshin sipërfaqen meziale dhe te huan incizal të kurorës së dhëmbit, atëherë diagnoza më e mundshme është
496	Në pulpë, pleksusi i Rashkow-it është një rrjetë e gërshetuar dhe e dendur

497	Terapia endodontike KONTRAINDIKOHET te dhembët me
498	Instrumenti më i përshtatshëm për bartjen dhe ngjeshjen e amalgamit në kavitet është
499	Cila nga mundësitë në vijim rezulton prej pulpës nekrotike
500	Një lesion 3mm i kufizuar gjendet në regjionin apical të paramolarit të dytë të mandibullës. Dhëmbi reagon normalisht ndaj testeve të vitalitetit.
501	Kariesi te të moshuarit më së shpeshti lokalizohet në cilën nga strukturat në vijim
502	Kundërkëndi me ngjyrë të gjelbër ka numrin e Rrotullimeve për Minutë (RPM) prej
503	Stimuli i ftohtë i aplikuar në dhëmbë do të shkaktojë reaksion të tejndjeshmërisë nëse dhëmbi
504	Gjatë vendosjes së kunjave parapulparë ato duhet të jenë paralele me
505	Si mjet diagnostik për zbulimin e ndryshimeve në strukturën e dhëmbit, diafonoskopia shfrytëzon
506	Kur kariesi i dhëmbit i afrohet maksimalisht pulpës së dhëmbit, por ende ekziston një shtresë e hollë e forte e dentinës së shëndoshë që e ndan, ë pulpën nga lezioni karioz, diagnoza më e mundshme është
507	Te preparimi i kavitetit të klasit të dytë gjersia e isthmusit duhet të jetë sa
508	Cili lloj i pulpitit karakterizohet me proliferim të indit fibroz
509	Karies profunda komplikata karakterizohet me dhimbje
510	Te inflamimet seroze të pulpës, pragu i ngacmimit të dhëmbit në raport me dhëmbin e shëndoshë është
511	Terapia e kanalit të infektuar mund të bëhet në
512	Niveli i obturimit të kanalit mundet me qenë
513	Aplikimi i kortikosteroideve në rast të hiperemisë së pulpës zgjatë
514	Lëndimet traumatike të dhëmbit të Kl së I-rë përfshijnë
515	çfarë lidhje (retencion) realizohet ndërmjet mbushjeve kompozite dhe zmalit
516	Drenazha te incizionet ekstraorale bëhet me
517	Cila prej këtyre anginave paraqitet në regjionin maksillofacial dhe është me etiologji dentogjene
518	A ka kontraindikacion absolut për nxjerrje të dhëmbit te infeksionet dentogjene:
519	Osteomieliti në nofullën e poshtme është më i shpeshtë se në nofullën e sipërme për shkak të
520	Simptomi i Vincentit është çrregullim i senzibilitetit të
521	Dislocatio ad axim është
522	Periosti i kockës te fëmijët
523	Le Fort frakturat bëjnë pjesë në frakturat
524	Funksioni i membranës sinoviale është
525	Muskujt mbyllës të gojës janë:

526	Paraqitja e përmabajtjes hemorragjike nga hunda është simptom
527	Tumoret beninj
528	Tumoret e indit kartilagjenoze quhen
529	Ca e gingivës është më e shpeshtë në kreshtën alveolare
530	Ca bazocelulare është Tu
531	Resekcioni marginal i mandibullës është
532	Mikrognatija është
533	Te Angina Ludovici përfshihen me inflamacion
534	Lokalizimi i infeksionit intraoral apo ekstraoral varet nga
535	Hapësirat e vdekura gjatë përpunimit të plagës evitohen duke:
536	Qepja primare të plagët në regjionin maksillofacial mund të bëhet
537	Imobilizimi i dhëmbëve të luksuar pa dislokim mbahet
538	Funksioni i membranës sinoviale është
539	Lëvizjet e mandibullës gjatë reponimit të mandibullës së luksuar duhen të bëhen:
540	Metastazat satelitore janë karakteristike për
541	Paraqitja e metastazave bilaterale në node limfatike është karakteristik te
542	Proqesi osteomielik mund të shihet dhe diagnostikohet me Rtg
543	Te frakturat unilaterale të proqesit kondilar pacienti nuk mund t'i bëjë këto lëvizje
544	Adenolinfoma apo tumori Vartin është tu beninj i gjëndërrave pështymore që më së shpeshti paraqitet në:
545	Potencial më të shprehur për alterim malinj nga të gjithë nevusët më së shumti kanë
546	Paraqitja e metastazave bilaterale në node limfatike është karakteristik te:
547	Simptomët e sinusitit maksillar akut janë
548	Te infeksionet dentogjene të regjionit maksillofacial dominojnë
549	Proqesi osteomielik mund të shihet dhe diagnostikohet me Rtg:
550	Cilat nga këto substanca rrisin taimin e pështymës
551	Cili nga pohimet për absorbimin e barnave është i pasaktë:
552	Klirensi renal rritet nëse bari:
553	çka është e pasaktë për rrugën intravenoze të dhënjes së barnave.
554	Nëse bari jep efekt të njëjtë pa marrë parasyshtë mënyrën e aplikimit preferohet
555	Përdorimi i dozave të larta të benzilpenicilinës si efekt anësor paraqitet:
556	Cili diuretik preferohet në reduktimin e edemave të një sëmurë 60 vj. me insuficiencë renale
557	Te shoku hipovolemik preferohet dhënja intravenoze :
558	Cili diuretik përdoret të gjendjet komatoze me edemë cerebrale:
559	Superinfeksionet me Candida Albicans, mund të jetë si pasojë e përdorimit të zgjatur të :

560	Cili nga barnat përdoret për të trajtuar infeksionet me virusin sincial respirator dhe hepatitin kronik C:
561	Për shkak të efektit teratogjen gjatë shtatzënsisë duhet të shmangët përdorimi i :
562	Cili bar shkakton hipoglikemi të të smuret me Diabetes Mellitus tip II, dhe maskon shenjat dhe simptomat e hipoglikemisë:
563	Terapija antituberkulotike shoqërohet me vitaminën:
564	Afiniteti i Co në krahasim me O ₂ për hemoglobinen është :
565	Antidoti tek helmimet me cianide është
566	Neuroleptiket ndryshe njihen si:
567	Antidoti tek helmimet me preparate organofosforike është
568	Me anoreksi nervoze nënkuptojmë
569	Oligoartriti është artriti me lokalizim në
570	Pë+D561r urinokulturë merret
571	Organizmin e mbrojnë nga infeksionet
572	Nxitësi më i fuqishëm i sekrecionit të acidit gastrik është
573	Ulcera peptike është sëmundje e
574	Prania e eksudatit qelbor në nyje quhet
575	Insulina ndikon në metabolizmin e
576	Enzimet Tripsina dhe kimotripsina ndikojnë në
577	Somatostatina
578	Kretenizmi është crregullim i cili vjen për arsye të
579	Aldosteroni ndikon në tubulet e veshkeve
580	Endorfinat(Met-enkefalina) si morfin endogjen ka
581	Barnat që e ulin shpejtësinë e zbrazjes së stomakut janë
582	Infuzionet intravenoze janë
583	Ciprofloxacina lë të antibiotikeve të
584	TTS-pergadesat përdoren për shkak të

BQESP në bashkëpunim me Komitetet specialitike dhe Katedrat e Fakultetit të Mjekësisë ka përpiluar listën e pyetjeve për përgatitjen e testit kualifikues për konkursin e specializimeve.

Kjo listë është përgatitur për të ju lehtësuar kandidatëve procesin e përgatitjes për testimin kualifikues.

Testi do të përmbajë përafërsisht 90% të pyetjeve nga kjo listë.

N.r.	Pyetjet per Farmaci
1	Ayurveda është mjekësia tradicionale:
2	Prejardhja e caffae Arabica eshte nga :
3	Insulina ndikon ne metabolizmin e :
4	Enzimet Tripsina dhe kimotripsina ndikojn ne:
5	Somatostatina:
6	Kretenizmi eshte qrrregullim i cili vjen për arsye të:
7	Aldosteroni ndikon në tubulet e veshkeve
8	Endorfinat(Met-enkefalina) si morfin endogjen ka
9	Barnat qe e ulin shpejtësinë e zbrazjes së stomakut janë
10	Po të perzihen 53.44ml alkohol apsolut me 49.8 ml uje në 15 C përfitohen
11	Molariteti i nje tretesire tregon:
12	Lotet kanë një vlerë mesatare pH-i:
13	Galantamina perdoret:
14	Tek Althaea radix duhet analizuar
15	Passiflora incranata ka veprim
16	Saponinet pentaciklike triterpenike kanë
17	Infuzionet intravenoze janë
18	Pergadesat parenterale jane
19	Parafinum liquidum perbehet nga perzirja e hidrokarbureve me
20	Efedrina ka me shume se norefedrina nje grup
21	Hekogenina perdoret ne sintezen parciale te
22	Pararendes ne sintezen e alkaloidëve tropanike jane
23	Ciprofloxacina l takon antibiotikeve të
24	Tek ekstraktet e lengeshme analizohet
25	Alkaloide fenolike jane
26	TTS-pergadesat perdoren per shkak të
27	Veti te fluidit superkritik ka
28	Ne trajtimin e hiperplazionit beninj te prostates perdoret
29	Rera e oksalatit te kalciumit eshte karakteristike për
30	Taninet e kondenzuara ndryshe quhen

31	Kontracepcioni emergjent përdoret brenda
32	Antagonistet e antikoagulateve oral janë
33	Cila nga keto substanca e rrit tajimin e pshtymes
34	Vitamina C është
35	Terapia standarde e zgjedhjes së parë për shërimin e anginës streptokoksike është
36	Kompleksi primar tek tuberkuloza primare përbëhet prej
37	tek profilaksa kronike e kontinuar e konvulzioneve febrile përdoret
38	Doza e insulinës me veprim të shpejtë (Insulin kristal) tek ketoacidoza diabetike, në kg të masës trupore është
39	Hemofilia A trashëgohet në mënyrën
40	Terapia standarde e zgjedhjes së parë për shërimin e ethes reumatizmale është
41	Konvulsionet febrile janë si pasojë e
42	Profilaksa kronike kontinuele e konvulzioneve febrile me Fenobarbiton bëhet në dozë prej
43	Anemia pernicioze është si pasojë e mungesës së
44	Si dozë terapeutike e anemisë sideropenike përdoren kripërat e fero-sulfatit në dozë prej
45	Profilaksa e anemisë sideropenike bëhet me dozë të preparatit të Fe prej
46	Hemofilia B është si pasojë e mungesës së
47	Mikroorganizmat të cilët për zhvillim kërkojnë sasi të vogël të oksigjenit të lirë quhen
48	Toksina me natyrë proteinike e prodhuar nga mikroorganizmi dhe i ekskretuar në ambientin përreth është
49	Aminoglikozidet veprojnë duke
50	Prania e kolinës është unike dhe luan rol më të rëndësishëm rregullator në hidrolizën e murit qelizor (autolizës). Kjo lidhet me
51	Qelizat që konsiderohen qeliza bazë për imunitetin e lindur lidhen me
52	Sëmundja e malaries varësisht nga shkaktari mund të zgjasë 18 muaj deri në 20 vite. Cili nga llojet e plazmodieve shkakton formën që zgjatë deri në 5 vite
53	Ushqimi për organizmin e njeriut ka rol
54	Aminoacidet esenciale i hasim në artikujt me origjinë
55	Nevojat fiziologjike ditore për ujë janë
56	Masat mbrojtëse të aerondotjes janë
57	Klorizimi i ujit është metodë
58	Njollat e Biotit lajmërohen te mungesa e vitaminës
59	Vitamina K merr pjesë në

60	Uji nga shtresa e parë nëntoksore lejohet për pije nëse
61	Stresi rritë nevojat për vitaminën C
62	Plumbi e kalon barrierën placentare
63	Cilët persona konsiderohen mikrobbartës kronik-hedhin mikroorganizma
64	Cili nga opsionet për tulareminë është i saktë
65	Cilat vaksina japin imunitet më të qëndrueshëm pasvaksinal
66	Vaksinat me përbërje anatoksike janë kundër
67	Vaksina kundër hepatitit B është në formë pluhuri
68	Për shkak të karakteristikave të virusit, hepatiti B është sëmundje më e lehtë se infeksioni HIV/AIDS
69	Imuniteti i fituar natyral pasiv vjen si rezultat
70	Karantina aplikohet te
71	Në vetëdijësimin e popullatës propaganda ka rëndësi
72	Cilat janë mjetet edukativo shëndetësore
73	Cka është barnatorja
74	Tregues të kualitetit të veprimtarisë shëndetësore spitalore janë
75	Nevoja psikike dhe fizike për vazhdim të marrjes së substancës quhet
76	Nevoja për rritje sasiore të substancës së marrë që të arrijë efektin e dëshiruar quhet
77	Delirium tremens haset te
78	Komplikim serioz i abuzimit me opioide është
79	Metadoni është efektiv në trajtimin e abstinencës nga
80	Amfetamina bënë pjesë në grupin e
81	Te intoksikimi me cilën nga drogat e poshtëshënuara kemi djersitje, ethe, tahikardi, zgjerim të bebëzave, ngritje të TA, mundim, vjellje, tremor, aritmi, konvulziona
82	Terapi efektive në trajtim të vartësisë nga kokaina është
83	Personat që veprojnë me violencë të theksuar dhe impulsivitet kur janë nën ndikimin e substancës kanë përdor
84	Te intoksikimi dhe mbidozimi me benzodiazepine duhet bërë
85	Cili nga vijuesit është kundër efekti i benzodiazepineve nëse përdoren për një kohë të gjatë dhe pa konsultim me mjekun
86	Antipsikotikët përdoren në trajtimin e
87	Antipsikotikët ndryshe quhen edhe
88	Haloperidoli bënë pjesë në grupin e medikamenteve
89	Risperidoni bënë pjesë në grupin e
90	Klozapina si efekt anësor ka

91	Depo neuroleptikët parenteral që përdoren për trajtimin e skizofrenisë janë
92	Efekt anësor antikolinergjik i antipsikotikëve është
93	Akatizia është efekt anësor i medikamenteve
94	Fluoxetina është
95	Anoreksia nervosa është
96	Pedofilia nënkupton kontaktin seksual
97	Fobia sociale është
98	Crregullimi i stresit pas traumës paraqitet
99	Klozapina si efekt anësor ka
100	Depo neuroleptikët parenteral që përdoren për trajtimin e skizofrenisë janë
101	Efekt anësor antikolinergjik i antipsikotikëve është
102	Akatizia është efekt anësor i medikamenteve
103	Eritropoetina krijohet në
104	Vitamina B12 absorbohet në
105	Diabeti mellitus tip 2 paraqitet
106	Kalikreina lirohet me reaksionet e tipit
107	Histamina është
108	Imunodeficiencat ndahen në
109	Temperatura është simptomë e
110	AIDS trajtohet me
111	Shkaktar i scabies-it është
112	Candidiasis mund të lokalizohet në
113	Herpes simplex recidivans mjekohet me
114	Dermatozat profesionale janë të natyrës alergjike
115	Si antidot pralidoxime 2- PAM
116	Doza standarde prej 0.4mg e naloksanit duhet të jetë e mjaftueshme për neutralizimin e efektit të mbidozimit të
117	Gjysemkoha plazmatike e barnave përcakton:
118	Cili nga pohimet për absorbimin e barnave është i pasaktë:
119	Qka bëjnë induktoret e enzimeve hepatike P450
120	Nitroglicerina konvertohet në monoksid azotit, si radikal i lirë reaktiv e që aktivizohet nga
121	Klirensi renal rritet nëse bari:
122	Cili nga barnat/substancat endogjene veprojnë me hapjen e kanaleve jonike:
123	Cili nga barnat nuk inhibon enzimet mikrozomale hepatike:
124	Qka është e pasakte për rrugën intravenoze të dhënjes së barnave:

125	Nese bari jep efekt te njejte pa narre parasysh menyren e aplikimit preferohet
126	Perdorimi i dozave te larta te benzilpenicilines si efekt anësor paraqitet:
127	Cili diuretik preferohet ne reduktimin e edemave te një e sëmurë 60 vj. me insuficiencë renale
128	Te shoku hipovolemik preferohet dhenja intravenoze :
129	Imipramina perdoret:
130	Cili diuretik perdoret te gjendjet komatoze me edemë cerebrale:
131	Glikozidet e digitalisit ndikojne në:
132	Bari i zgjethjes te aritmit ventrikulare të rënda, si pasoje e toksicitetit të digitalisit është:
133	Superinfeksionet me Candida Albicans, mund të jetë si pasojë e përdorimit te zgjatur te :
134	Cili nga barnat përdoret për të trajtuar infeksionet me virusin sincicial respirator dhe hepatitin kronik C:
135	Sindromi i "Bebes së përhirt" si efekt anësor I kloramfenikolit manifestohet te femijet për shkak të:
136	Fluorokinolonet kunderindukohen te femijet nen moshen 18vj. për shkak se mund te manifestojnë:
137	Për shkak te efektit teratogjen gjatë shtatzënsisë duhet të shmanget përdorimi i :
138	Te trajtimi me glukokortikoide si efekt anësor paraqitet:
139	Cili bar shkakton hipoglikemi te të smuret me Diabetes Mellitus tip II, dhe maskon shenjat dhe simptomet e hipoglikemisë:
140	Ne mbidozimin e paracetamolit si antidot perdoret:
141	Terapija antituberkulotike shoqerohet me vitaminen:
142	Ergometrina perdoret si:
143	Goma arabike përfitohet nga bima:
144	Depo pergadesat veprojnë më gjatë sepse:
145	Afiniteti i Co ne krahasim me O ₂ per hemoglobinen eshte :
146	Antidoti tek helmimet me cianide eshte
147	Barnat që veprojnë drejtpërdrejt mbi agjentet shkaktues të nje sëmundje quhen barna:
148	Supostet me polietilenglikol, veprimi i tyre në krahasim me tabletat orale është:
149	Molekulat që lidhen më receptoret, por pa shkaktuar ndonjë përgjigje biologjike quhen:
150	Gjate biotransformimit te acidit acetilsalicilik formohet:
151	Promedikamenti Azotioprina perdoret në ketë menyre ngase:

152	Neuroleptiket ndryshe njihen si:
153	Frenuesit e monoaminoksidazës kanë veprim:
154	Benzodiazepinat karakterizohen nga një sistem unazor i kondenzuar i përber nga:
155	Laktamet ndryshe njihen si:
156	Receptoret benzodiazepinik gjenden krejt ngjitur më receptoret:
157	Flumazenil vepron si:
158	Teofilina është:
159	Lamotrigina ka veprim:
160	Morfina ka:
161	Fentanili është derivat i:
162	Zavendësimi I grupit N-metil të morfines më grupe me të mëdha alkilike:
163	Ibuprofen është derivat i :
164	Penicilamina perdoret dhe të:
165	Nafazolina është derivat i:
166	Atropina paraqitet si:
167	Neostigmina vepron si:
168	β -bllokusit, përmes bllokimit të β -1 receptoreve, frenojnë në mënyrë konkurruese veprimin:
169	Programet për parandalimin e sëmundjeve jorgjithëse
170	Metoda epidemiologjike e hulumtimit shkencor
171	Burimet dhe grumbullimi i të dhënave në epidemiologji
172	Faktorët e riskut të sëmundjet kronike jorgjithëse
173	Validiteti i një metode diagnostike në shëndetësinë publike
174	Vlerësimi i gjendjes shëndetësore të popullatës
175	Organigrami gjeneral i një studimi epidemiologjik
176	Aplikimi i metodës epidemiologjike në Shëndetësinë publike dhe në Mjekësi
177	Klasifikimi I studimeve epidemiologjike
178	Hulumtimi epidemiologjik i sëmundjeve ngjithëse
179	Fshehtësia profesionale
180	Karakteristikat epidemiologjike të sëmundjeve kronike jorgjithëse
181	Etika në hulumtimet klinike
182	Aspektet kualitative të diagnostikimit në nivelin e kolektivitetit
183	Planifikimi shëndetësor dhe plotika shëndetësore
184	Principet e menixhmentit në shërbimin shëndetësor
185	Koncepti i kujdesit shëndetësor parësor
186	Karakteristikat e sistemit shëndetësor në Kosovë dhe organizimi

187	Epidemiologjia klinike
188	Roli i sigurimit social në mbrojtjen shëndetësore
189	Qendrimi etik ndaj pacientit ne kirurgji
190	Diagnostika mjekësore individuale dhe kolektive
191	Multikauzaliteti i sëmundjeve kronike jongsjtëse
192	Qendrimi etik ndaj femijes se semure
193	Depistimi i sëmundjeve
194	Qendrimi etik ndaj pacienteve ne gjinekologji-obstetrike
195	Rezonimi kauzal në mjekësi
196	Kriteret në gjykimin e relacionit shkak-pasojë
197	Karakteristikat epidemiologjike të shkaktarit, individit dhe ambientit
198	Etika në shëndetësinë publike
199	Aspekti etik i masave preventive dhe studimet epidemiologjike
200	Komparabiliteti dhe reprezentativiteti i studimeve deskriptive
201	Studimet në klinjkë dhe në shëndetin e komunitetit
202	Roli i epidemiologjisë në administrimin dhe planifikimin e shërbimeve dhe programeve shëndetësore
203	Etika dhe eksperimentimi me njerëz
204	Relacioni mjek-pacient
205	Detektimi i parakohshëm i predispozitave gjenetike
206	Aspektet kuantitative të diagnostikimit në nivelin e kolektivitetit
207	Regjistri i kancerit
208	Indikatorët e shëndetit
209	Parimet e kujdesit shëndetësor;
210	Të drejtat dhe detyrimet qytetare;
211	Kujdesi i detyrueshëm shëndetësor;
212	Standardet e kujdesit shëndetësor;
213	Nivelet e organizimit të kujdesit shëndetësor;
214	Kujdesi parësor shëndetësor;
215	Kujdesi dytësor shëndetësor;
216	Kujdesi tretësor shëndetësor;
217	Themelimi dhe organizimi i institucioneve shëndetësore;
218	Udhëheqja dhe mbikëqyrja e institucioneve shëndetësore;
219	Kushtet dhe procedurat për zbatimin e kujdesit shëndetësor;
220	Financimi i kujdesit shëndetësor;
221	Sigurimi themelor shëndetësor ;
222	Sigurimi i mjeteve për punë të institucioneve

	shëndetësore;
223	Sistemi informativ shëndetësor;
224	Llojet e institucioneve shëndetësore;
225	Licencimi i punëtorëve shëndetësorë;
226	Kushtet dhe procedurat e licencimit;
227	Specializimet, kushtet dhe procedurat e specializimit;
228	Edukimi i vazhdueshëm profesional;
229	Veprimtaria private shëndetësore;
230	Licencimi i veprimtarive private shëndetësore;
231	Këshilli i përgjithshëm profesional;
232	Mikëqyrja profesionale;
233	Ndërprerja e shtatzënisë dhe sterilizimi artificial;
234	Kujdesi shëndetësor gjatë gjendjes së jashtëzakonshme;
235	Përgjegjësitë disiplinore të punëtorëve shëndetësorë;
236	Kodi etik mjekësor;
237	Cilat janë rastet e kundërvajtjeve dhe shkeljeve administrative nga institucionet shëndetësore;
238	Rastet e kundërvajtjeve dhe shkeljeve administrative nga punëtorët shëndetësorë;
239	Edukimi themelor profesional;
240	Provimi i licencës (provimi profesional).
241	Shoku dhe llojet e tij
242	Gjakderdhja
243	Koma diabetike
244	Abdomeni akut
245	Ulçera gastroduodenale
246	Frakturat
247	Aborti
248	Toksikozat
249	Glaukoma akute
250	Djegjet
251	Infarkti i miokardit
252	Diabeti
253	Hipertensioni arterial
254	Ciroza e mëlçisë
255	Astma bronkiale
256	Ethet reumatike
257	Anemia pernicioze
258	Cianoza
259	Tuberkulozi
260	Glomerulonefriti
261	Ileusi

262	Kalkuloza e fshikzës së tëmthit
263	Apendiciti
264	Lëndimet e syrit
265	Placenta previa
266	Dezinfektimi
267	Sterilizimi
268	Hemorragjitë gastrointestinale
269	Bronkiti akut
270	Sëmundja e Kesonit
271	Hemotoraksi
272	Helmimi me CO
273	Migrena
274	Pankreatiti akut
275	Epistaksis
276	Shtatzënia
277	Hemorroidet
278	Artriti reumatoid
279	Edema pulmonare
280	Barnatorja
281	Receta
282	Dozimi i barnave
283	Papajtueshmëritë e barnave
284	Grupet farmakoterapeutike(Antibiotikët ,kortikosteroidet ,analgjeziket etj
285	Lëndet ndihmëse në përgaditjen e barnave
286	Ekzekutimi i recetës
287	Përgaditja e barnave magjistrale
288	Përgatesat bimore(çajrat, ekstraktet, shurupet)
289	Format e gazta (aerosolet, inhaluesit, mjegulluesit)
290	Format e lëngëta (tretësirat, pikat, pezullite-miksturat, emulsionet)
291	Praparatet sterile (ineksionet, perfuzionet, infuzionet)
292	Format gjysëm të ngurta (pomadat, pastat, supostet, xhelet, sapunet)
293	Format e ngurta (pluhtrat, tabletat, drazhjet, kapsulat, pilulat)
294	Izotonia
295	Pezullite
296	Emulzionet
297	Kapsullat
298	Film tabletat
299	Emulgatoret
300	Tretësirat alkoolike

301	Tinkturat
302	Ekstraktet
303	Çajrat
304	Antikoagulantet
305	Lendet konzervuese
306	Keratolitiket
307	Homogjenizatorët
308	Solubilizimi
309	Shurupet
310	Ambalazhimi I barnave
311	Filtrimi
312	Skadenca e barnave
313	Zingjiri I ftohte
314	HPLC
315	TLC
316	Perkolimi
317	Drazhete
318	Antiastrmatiket
319	Antihistaminiket
320	Antimikotiket
321	Antibiotiket β laktamik
322	Laksativet
323	Hepatoprotektoret
324	Diuretiket
325	Mukolitiket
326	Antitusiket
327	Supostet
328	Pluhurat
329	Antiagreguesit
330	Venoprotektoret

BQESP

Prishtinë,

25 mars 2011